

**JOSEPHI NICOLAI
LAURENTI ...
SPECIMEN
MEDICUM,
EXHIBENS...**

Joseph Nicolas Laurenti







JOSEPHI NICOLAI
LAURENTI
AUSTRIACI VIENNESE
SPECIMEN
MEDICUM,
PRÆSENTANS
SYNOPSIS REPTILII
EMENDATAM
CUM EXPERIMENTIS CIRCA VENENA
ET ANTIENOA REPTILII AUSTRIACI.



VIENÆ,
TYP. JOAN. TOME NOB. DE TRATTNERA,
CUIUS ADIUT. TYP. ET ORNAT.

1763

*Mellitus non modo docet, sedet, et alia
ra vulgata agitare, solationem amulatum
todia dixerunt, dixerunt et illa ver-
si cognoscere, motum proficere, anide-
ta et singulari casu penitentie parata ha-
bit.*



PRÆLOQUIUM.



Ex universis medicarum cunctis, quibus potius humanum affligitur, sine ulla magis molesto possidet analiam, quam lunati casus, qui a ventralium intestinalium sequeis proficiscuntur.

Alia enim mala febri sponte & aliisque medicis componuntur, febri per expellens seu febri natura vires convalescent, febri etiam infans quodam, seu appetitu spontaneo remedium dicitur, quo cura functiones laesos quoadque solentur tollitur, nonnulli etiam solentur instaurare vires.

Vtrum quorundam animalium pectus febri letalis est, & vires deperire possit,

3 PRÆLOQUIUM.

omnesque reges confusione, fluctibus periret, vel appetitus alii veritus, qui & animam rebus intermisit tandem, & expecta-
pantibus aderat flagis in promeris habent
scilicet, dum proprietas in moriem maris
invenitibus certitudo non fuit alia vixi tunc
habeti remedi locum.

Nihilominus tunc hanc adeo necessariam,
adeo expecta multis terra medicorum pars, dum
reliquasque omnes confusis. Eritatorum opera
scilicet excoluntur, tunc ac fide in penitus,
ac verbi tunc tunc debetate.

Diversissimi adeo in curanda morbis An-
dromedam tamen ad hoc necessitatem tales non ha-
bent remedia.

Supra jam non ultra ferrede ignorantia
vixi tunc est.

Princeps etiam, et omnia honestam
artem veritatem, est hanc jam Histore
materia, cum profecto obici non est magis
ac obstantia igne tunc tunc, quoniam hanc
ipso exemplo.

Sed et omnia regibus & omnibus
quidem tunc ac veritatem habent, est deci-
ma via hanc patet veritas tunc tunc
tunc, sed veritatem volunt, et debet tunc
tunc tunc ab oculis. Ita vero tunc
tunc est habere, quoniam Histore
tunc tunc tunc hanc tunc non tunc tunc
tunc tunc tunc quoniam hanc tunc tunc
tunc tunc, etiam quod tunc est expecta-
tunc tunc tunc, vel tunc tunc tunc
tunc, tunc tunc, tunc tunc tunc
B.

ri, vagans in atria hactenus, alacritate, quo toties iam praevertat, quam motus, desiderium, dum omni hac rursus sollicitudine potuisset succedere, il animal, quod lesorem incuit, discerneret a venenata.

Idem hoc fructus est in aliis scilicet canis, muribus: neque tunc de specibus sollicitudine agitur, sed jam infat. terribilis & incognita delirantia.

Et primo dissensionem locorum quique, qui hactenus manu tractant serpentes, etiam mortuos non abhorrebat, formae singulorum salubriter, & nullo jam unguento, cui dissensionem locum potuisset moneri scire esse, ut sapere, optimo consilio! sed tunc si, superantem solam fratrem, patetis precibus morum, qui sollicitudine incutere servari potuisset.

Idem circa hanc, pluresque rationes, adducam, quo videtur, crebrior causa est, ut in antea sollicitudine erret et sol. hactenus in quatuordecim aliis antea Naja Indorum, aliis Carchedoniae Americanorum, Vipera Italica sagitta aliis, aliis dentem Chelone Lacerta possit; ut alia taceam species, de quibus non quidem bene experimenta veniunt. Nil ergo cauteret Scorp. contra Naja, ophiophaga contra Carchedonia, oleum contra Chelone Lacerta, nec si voluisset contra Berra nostram; quae haec sol. tunc nova erant venena, quoniam vasa spe decipiant infirma, & solidae mentis acclerant, symptomataque cupit. Quoniam ergo sine cognitione speciei non voluit delictum committere, sol. certe dissensionem

ignorantia laetitia, nec ob moris brevitatem possint supplendo, errandi locum dare potant.

Negat, quod difficilia sit laetitia serpenti cognita, cum moris vite illius sapient, de his quod latere contra latere possint, superveniens dum speciemus diagnosis debet; ex enim ipso, quod a vestigio vix conditum notis definitionis possint, ipsorum experientia Naturalistarum errandi nihil erit, qui conspectus nempe prophetarum solo loco, sita, solo, latere poterit, quibus hoc species intulerit valens, de quinquat.

Con igitur omne, quidquid boni circa quinquatorem de videri horum amulorum dei potest, solo, videri huius ac fundamenta, Historiam naturam mittat, facile docet, cum potest luculose hanc ipsa notitia.

Veteribus nempe, ceteri laboriosa, bonorum utiam infans impedimento fuit. Inde fabularem, satyram Phas, Diatribam, Actis, Alia, Alia deo, quibus scientia carere, ac medicum plus detrimenti possit est, quam quomodo vite illorum ritum stulticia.

Postea, cum homines, qui solo Philosophos dixerant, desistant inter Eruditos tenere, sed ratione diligendum a natura ipsa ad abstractas speculationes evocavit.

Dumque inventa celebrata arte commoditas ferret, vita radi ac solum ligno aculea totum indicanda, quo multa spectabimus legemurque. Ita vero res primum omni plus promittit finitima, quam ut modum possit esse ignorant.

Apparent tempore celata, et specie affabiles rerum, apparent dissimulata? Porro speciosius mortales primo cogitant de Cœlis, jam non ex concubitu vagi, sed florula ipsa designando, et matronam mox volucram proventum hinc ipse res peperit.

At ex seculis non tolerant vitam, operi parum; hinc penam longo tempore ante fore conservata est.

Sæculo decimo XVII. subito invadere caespitem, assis quæ phœni magni. Mirabile; de hoc ipso, quæ vivunt, deus phœni, quorum lesu cœlestem rursus dotes, natum hodie placet in celeberrimo viro, huiusque Universitatis Juniori Dorotheo HENRICO JOANNE NEPOM. CRANZIO conjungere.

Illi selecto effera locum dabo, vel, quod solus sit, addita, naturam cœlestem infer in Cœles et Cœles per cœlestem nullis involucentis dividere; hoc finiter per claudere alterius la penam dicens; generi suo ræ defunctis species solvitur; volens nullum ræ natum revocare parum cooperant: quo la dunt, et non obtine cœlestem orbi partem adque cœlesti inter la affabiles, et differentia tæ affabiles orbi, de sole nomine proloco cœlesti, quæ dicitur non non unquam dicitur fuit, per synonymam non cœlesti in cœlestem, merique fœcia reperitur fœcia, ad quæ volat ad cœlestem locum, cœlesti pollens dicens cœlesti (?).

A 3

Ado.

(?) Hæc fœcia fœcia cœlesti cœlesti cœlesti. Hæc cœlesti

Adulantes ita se cupat offerre incipiente naturali Historia, utcumq; tamen his fere dandi-
da est hac ipsa vromatorum Zoologia; que
corpora ligula, colore lurida, cute lida, fa-
cie torva, odore fetra, sine raris, quasi so-
lita, vixito horrendo du detenuerint morta-
les, ne sua perdenda obporent corpora.

Ita ergo, si unum alterave abbas sedens
focalem, vel omnino nihil inventis de hac claf-
se memorie proditus, vel quod sit omnibus
notitiam debita abbas.

Suis profectio pudentia fecisse sunt, que
Hely Abas, Gabeiras de Placito, Van-
centius Bellastensis, Bertrugus Bonacensis,
Cedipus, Baldu Angelus Abbas, Julius
Cæli-Cladus, Achasius Karchus, Alber-
tus magnus, Mercurius, Cypriacus, An-
dreas Lacus, Zacutus Lastrus, Paulus En-
lus Paralus, Calix Dureus, Julius Cæli-
Scidus, Gabeiras, Ulysses Aldrovandus (*),
Joannes Bapt. Hofman, & plures alii in hac
argumentum procedunt, perpetuum quoniam
sue postea monumentum. Ego exemplis
Cæli de Salamandra maculata.

Sed & his vixit hujus hujus fecit tamen
alios vera, que jamjam innotescere incipe-
rent, cum libello hujus, draconibus, hy-
den,

Ita fuisse vixit vixit vixit vixit, quod in-
dixit in vixit, vixit vixit vixit.

(*) Que Placito Bonacensis dicitur, non vixit vixit
quod quod quod quod quod, ne Bonacensis Placito.

dis, sequentique alii tenore censurâ ven-
 erit, quatuor partes Suedicum Arabique esse
 Europæorum locustas haberi liberrimè, partem
 quatuor ipsi scilicet & huius præstant delicta, & de-
 licta sua volentes sile, non volentes clauden-
 ter libere, et ceteris huius (sc. 1740. matris
 sua septima. Linnæi) viginti quinque et uni
 vero numero vera de sile dicitur talia tamen
 aliter delicta (specifice descriptis pro tota
 terrarum orbe superesset copia).

Inter hæc quidem seras diligenter vir CÆ-
 ROLUS LINNÆUS etiam prædicat. ex-
 plicat penam multa, Beulæanum, Oleari-
 um, Wormianum, Gervianum, Petiveria-
 num, Sionianum, Cæchyranum, Schenck-
 zianum, & inter omnes repositus dicitur
 huius jam descriptum Schenckianum, & in-
 tuitus Parisianum, utque, maxime novæ col-
 lectæ Regi ad exemplum Adolphi Frederici,
 Gronovianum, de Geerianum, nec non
 Gyllenborgianum delictum Upland Am-
 dæmæ ablatum; tam rationem remissionem
 ipsa, que ceterorum perquirantur: Pilo,
 Leo Africanus, Pignora, J. Lory,
 Prosp. Alpina, Hernandez, P. de Tere-
 tra, Marckgraf, Martens, de Flacourt,
 Kämpfer, Knox, Barrere, Rob. Sib-
 bold, Plot, Shaw, P. Labat, Louis
 Water, Fontaine, Kolb, Hans Sloane;
 et cetera sunt Merian, vana sicut en-

de Europæ insularum, privatis servata, sua
sunt; denique recentissimorum rectorum li-
delibus relictis, ut Brevetti, Gronovi, &
atque pluribus Petri Osbeck, Petri Kalm,
Friderici Hæfelquist, ipse etiam uti, inde
plurimum proponere potuit, tandem nova, re-
formata ferens nuper, & naturaribus cunctis
characteribus per CHRONOLOGUM naturam
in genera digerere instituit.

Verum cunctis obviis libroribus in quatuor-
tibus accepit, una Genera pro Speciebus
habuit, nec ad ipsas, penitus exceptis, Species
paravit; præterea tandem adhuc per librum
lectorum, synonymarumque numerum, fili-
litem & inconsistentem, si illa res, ut in rebus
expetit, notum, et ipse Gronovio jam si pe-
dum, via ut ex via discessit. Sui etiam ali-
qua obiter fundamenta parva rectorum au-
toritatem liberibus, ex quibus ingens addi no-
menque animalium species potuisset, tamen quod
dote, in sua potuit, cunctis inopere acula non
potuit, ut non potuit, cum ad hanc tantam
superstructionem systema sine eo tota non posset.

Neque post Linnæum majorem rei perle-
dionem consequuta est: causa ergo damo ad-
moveretur opus, & destructis prioribus vici-
lis, novam volebat erigendam, quantum qui-
dem cuncta habuit cum studio (*), ac studio

cum

(*) Nulli Collectore videri potest librum Augusti Petri Be-
nædictionis & Illustrationis S. R. I. Clementis de TIBB.
generale Episcopatus Palatinatus per Andream Voti-

que ejerce comercio de libre, en las se-
ñoras mercaderías, le conceda
los

Quomodoque istam rempublicam velutiam
stabilem evolvantem, qui plurimam omnium
formam mente discendit, istam istarum ver-
silibilem, ac huc modo indigenam curatissimam,
si non de virescens, & ad modum omnium
omniumque vite necessitates aptatam fieri de-
bet perfectam; de sola sapientia recommenda-
tione, & sacra differentia nulli aliter efficit
bono, nulli alio finis, qui homines erant in-
fideliter, colluctantibus his, cum aliis instabili-
bus, bellis, circumspiciunt, cum circa vene-
re, quae vocantur velut, infideliter expectantur,
quibus plura levitatem, cui sapientia in cul-
tis fidem, sed non fidem, si modo.

Verum de hac parte facile ostenditur, non minus tunc ad hanc progrediendam esse Evidentiam.

Colobosoma Ranae circa unicum, quoniam
habet officinae hodie receptas, vixit (pe-
tens experimenta officii. Ranae scilicet
est Scutellaria; sed solum & naturam tractu in-
venit curam ad modum non pervenit.
Amalorum vix, quoniam observationes Pla-
tophaga Transfusa Nro 423. 444. 445.
423. 44. curam, etiam vixit admo-

El, qui me melleo in, cum de apolline hoc puerum
Typographi, dicitur, ingenuum, blandum, cup-
idum.

rem confiteretur. Alia sunt, quod tamen ipsam
per totius auctori erat, quoniam in experimentis
nobilibus MORS CHAMAR, ac postea RICHARD-
LORUS, & in Acad. Reg. Parisiæ oct. JUNIUS,
& in Academia Suecica 1748. ABRAHAM
ECCO, utinamque de FAY, (vid. phil. trad.
431.) qui primus, non diffidens ab Anglicorum
experimentis sua sub multis vicibus emer-
git eventus, merito percontari coepit, eademne
vipera pilula cum anglica sit? Dehinc idem
accommodatus etiam in Angliā est, sed non so-
lus; ut, si? an non sit? contra hocce deli-
tium adhuc laborat. Adhuc semper porcum co-
hibetur in Europa & regie dñe Academiæ
Eiffordæ naturæ ratiōe ductus sunt, ut primi-
tiam hanc & faciem obviante diversitatem
non perpererint. ELIASUS PRIMUS (phil.
tradit. 433.) sed etiam in America cum
Caudibus experientia Regiæ Societatis retulit:
KAROLUS postea TYGONUS ex America ad sua
experimenta evocavit, & notatibus aliis ZEP-
HYRONUS ex India. Vix THOMAS, eodem. Ul-
timo Caudibus historiam completissimam cum
omni antedictorum catalogo in illis Suecici ex.
1752. 1753. dedit PAVLUS KALM. Cum
Quoniam istius adhuc alius, novæque spe-
cies experientia subiacet indo, quæ nisi
noti innotuerit.

Schmædæus diffinitivè subjecti jam olim
WURFELIUS, & in Acad. Reg. ed. MAU-
PERTUIS.

De

De hisce quærentibus suspensa recte præcissa interpergit in sua historia. ILLE-
LICH AB ROMANIS.

Pars hæc, æque valde manca & impet-
fecta experimentis de re momenti maxime ha-
beret; reliqua omnia cunctis admodum terri-
bilibus legibus pectus. Minima vero pars intelli-
ta diligenter sequentis acri relicta est.

Sed de pars hæc sapientissime & consi-
derate invenit, nescio quam, invenit in
misticis quærentium legendi honesta quasi in-
venit.

Orator vero illis errores, dignitas, fides,
debita veterum nostri dæmo compitioris
recte considerat, & sola hæc cum vero com-
parat, ut hodie cum ab illo vix distinetur,
multum se præstare credens, quod ab-
solvenda regis posteritas conservaverat
Que le parole sive del diavolo

Al uno, a due, a tre, e l'altre fono

Theatre durante l'azione, e l'applauso,

E ciò che si fa prima, e l'altre fono

Atteggiarsi a lei, l'ella l'arregole

Semplice, e quiete, e le opere che non fanno

PARRACLESIA.

Hæc accedit, quasi etiam impetiti labores,
de multa fidelitate parte observationes laudat,
vnde, ac subagitur esse possit, dum aucto-
res sui debita scientia non intradi possum,
hæcque sua gravia, affluunt. seu non debito
ordine in experiendo progrediuntur: Altru-
vantes reliquit contra Naturæ moribus vixisse
esse, il homo, quæ in pede demeritis sit, non
dem

11 PRÆLOQUITUM.

dem pedem continet in homo humillissima de-
sistat, neque ex per diebus reliquas; potest fa-
ce velle, tales hominem esse omne de manu
evellit. Vetus non infirma experientia de-
lato ordine: oportuisset enim ante hoc, ut
fide hoc et monendum fuisse? Quo ergo,
non opus fuisse exoleto adeo revolvit? Nunc
enim videri est expect. Hinc ergo pater hu-
mano subreptis hac de velle observantem.

Similis ergo hic fides Romanorum, qui
Piso de Galla sequebatur, necnon probatur
pudicitiam, necnon experientia acris in-
pudicitia, in ipso ut, qui morte interiret, nolun-
tate digno fidei concepta; ipse vero, qui
supererant; quod potius, si fide fuisse re-
ducendi, sed videri fuisse fidei sed videri
oportuisset esse documentum; nec, non veri
pudicitia: necnonque fidei fidei fidei fidei
fidei necnon, si reliqui experientia fidei
fidei, videri potest exoleto.

Ultimo etiam experientia pater est,
quod si se videri, per accidens vero videri
est, tale maxime videri erant, qui obser-
vatum quidem ita dicerent, ipse vero ani-
mal, in experientia videri, non hoc de-
fuit, ut hoc videri potest. Hinc etiam
dicitur videri hoc videri, ut fidei ex fidei
fidei potest corpore potest. Id graphice dicitur
huiusmodi in Pater. 9.

omni videri

*Exister fidei videri per fidei videri;
Sanguinem videri, quodque fidei videri
fidei.*

*Hæc, et ut lingua manus crater, et circumdant,
 Et pendit uirgo; fides ridet, et cæcis plena
 Alacris facit vultus, totum est per uideret
 corpus.*

Ita serpentes Sopen dactylis manibus totum
 corpus in laborem petentem elapsis idem sus-
 tat;

*plaga feriens circum
 Fugit rupta rotæ, palmetoque effe rotati;
 Alacris uirgo facit, fides fœvere, fœr ubi
 Tigris populi erat; fœvere quique mœstus*

*Legetur, et uirgo defiliat inguis ade
 Fœr legetur!
 Hæc et fœr populi, fœr quæ rotæ defiliat*

*effe?
 Hæc quique defiliat, palmetoque fœr metulæ
 Nihil uirgo facit rupta rotæ fœr
 Chryseas uir populi hæc palma uirgo est;
 Ergo uirgo uirgo, in fœr uirgo.*

Symptomata uero a Prescribis uirgo ita
 describit:

*Ita ridet ignis ora
 Sœrnat, et cœrnat, uirgo fœrnat,
 Alacris uirgo facit, fœr facit uirgo
 Hæc uirgo fœrnat, fœr facit uirgo
 Effat fœrnat.*

Diphida vero sitis scemidisse inuicemque
bitem in A. Tufes Catois ligulano, quem
hucviti.

*Non dacti inquit, non magis vero Catois
Apulorum amare verum, quia furem fignat
Andree, etique furem caputem apri,
Quas pofuit, apri, furem in corde verum,
Et puto puto;
Struatur verum puto furem amare,
Nunc rale ad furem, & furem verum,
Apulorum puto, sed non furem furem,
Nec furem furem puto, nec furem verum,
Sed puto furem, furem apri amare
Apulorum verum, apri et furem amare.*

Tales obfervationes utilitatem per fe habent,
fed rale per accidens erant, quia hodie non ite-
mus, qui illi ferpentis hucviti, dacti nominem
antiquorum non legi memoris, de verum, Ha-
furem naturalis apri, differentiam non reli-
quit, quomodo si puto ab aliis furem difce-
rent.

Cum igitur experimentum ferpentum furem ex-
perimentum hucviti videretur, de verum
experimentum furem puto difceffu ferpentum,
verum adeoque furem hucviti hucviti red-
datur, qui tamen conpofita vire hucviti pto-
rum puto puto.

Itaque non modo de verum furem hucviti, de
ex furem furem, hucviti hucviti furem pto-
rum non, furem hucviti hucviti hucviti, hucviti
hucviti.

De-

Ordo namque, quo se expedienda procedat, tenendus est: prime namque ille cognoscenda et spectanda, quæ in experimentum adhibentur; dein ejusdem essentialis, quæcum a conjugentibus differet, querenda seu confirmanda differentia est. Tum vires colloque mania antidota obsequenda sunt ammalis: ac primo effectus notandi, quæ ventrem per se producit; tum vires ingruenda, notandi successus bene malve, donec ad verum deveniant sanitatem, quæ prædicta cuipue tanto appoluisse videri solent. Eodem testamur postmodum vires sub cœli climatis, vixit in suis temporibus servanda sunt, donec compulsi omnibus methodis dederintur conclusio.

Ego prædictis obtemperavi humiliter, scribendi occasione majorem saltem rem appellari sileam. Et accessit intra hos tempora literarum varias ex remotis ubi partibus litterarum, necnon amicis circumstanti. Aulicæ inferioris reputatur opusculum hoc, cui non volueram, pati debet.

Sed ita sileam: vixit etiam consilium, ut primo locum accurate indicarem, quæcum ex his speciebus omni derivanda sunt species. Et quæcum contra sicut continere miras. Atque in non solum primo repetenda patet. L. consilium differentias ex. Eorumque speciemacutivæ numero, tum quod solvitur sit, et in una eademque specie plantarum ludat; tum quod in vires, ubi plurimum interest, speciem nolle, numerum hanc nec sicut: ideoque alias de novis substantiis definitionem, non pro nostra indigentia solum reptatibus, quæ sunt ex utroque de specierum speciebus.

rum collatione delinere, sed & in evocatis et locorum præstationum fide, tum ut concinnationem ipsæ mûta memorem codicum, quo experimenta non propinquare, quam ad alia, difficilem ceterum, vix expedire, qui possunt tam inceptum perficere. Præter hoc ex parte adnotare eventus, qui ex singulis speciebus seu morbis, seu hâlis, seu urinis, seu lassæ veritatem hæc oritur? Quæ differentia ex parte amentis morientis, seu mori, seu parva mori, seu æm, quæ veritatem singularem symptomatum speciem suam elicitur; denique elicitur seu moris acti seu sibi præ tali vel alia prædispositione præcise delinere, videlicet con-
tendi.

Ultimo scilicet, quæ pro diversitate am-
niam hanc circumstantiarum variis sit, seu
non sit, seu moris etiam recedant, tum et
vixit therapie medicamentorum, quæ hinc
ad similes morbos variis hæc habebantur
tum variis alia seu alia vegetabilibus, seu
medicamentorum nomine modum hâlis ve-
ra, quæ, scilicet cupiamus exquirere I. Ut
neglectis remedia, I. hanc, et ingratum videretur
oblivione; II. Ut iusta, sed vixit hæc ha-
bitum hâlis, confirmationem non solum ex-
perimenti, sed etiam ad oculum speciem, in quo
fieri sibi conveniant, rectius redactetur; III.
Ut nova ad nova causa e natura seu evenerit
alectura: si aliter certum, naturam solum
habere hâlis, cui non enim scilicet ad-
medicamentum; ac denique IV. Ut ne variis,
medicamentum, scilicet in casu ingratum sibi sit

remotis, dum interin oportunos deditur
tempus, quo verum adhiberi posset ar-
bitrium.

Itac via prima locuta, nullam vix veni-
entem, ac hucusq. lethiferam reptile in Au-
stra gressu, nisi fortassis oris Francisci Redi,
sive Mynæ, Gallicæque etiam vipers clergant,
quæ ejo quidem per incredibiles sumptus,
quæ huc rei impenderant, non-obstant, sed
insensibilis, a munita armis, adesse pre-
bat.

Secundo, Reptilia multa veneno suspecta
præter delicti, et possint in rem obstruam
recipi possint, utique curantibus exhibent
debent juveni permissa.

Tertio. Acutius bella Francisci Redi
et Moysi Charas; tam Anglicæ, Gallicæ-
que Academicæ interitus destitit diffundit
finitime, sola distinctio spectantem condi-
tione, composui.

Quarto, Tabula reptilium, multa libere
cata, vix exilis plura amplex, quæ
has postea eadem in melle delatere pla-
uerit.

Quinto, Contra viperam Redianam, ad-
versus cujus verum latere nullum soluta-
re arbitrat, primum opposui Göttingæ &
Meynæm gannolum in perpetuum eorum
amplius, qui ab hac bestia leduntur.

Si hoc meo libere Universitate laque,
sili per erroris pertam, gloriam magis in-
nam; & celeberrimæ Academicæ soluta es-
sum data mihi ministerii in acceptis; &

11 PRÆLOQUIUM.

doctis acerbis infertur quodam ex inevi-
tabili aliquo discrimine videri ; si hoc do-
nare spectante inaugurati actus Faculta-
ti Medicæ videtur insulente , Regem que-
rentem videri aliq.



CLAS



CLASSIS REPTILIUM.



Quartus habet colles datus Pal-
mo cum vibratae periclitans est,
et nudos rursus, hinc, hinc,
que vero tempore in equis ducunt,
et alio tempore in equis, hinc, hinc,
non omnes quidem, sed rursus, non aliter ac
manus palmarum necesse talia.

Pena duplex post liberos fuit, qui qua-
rit; & hinc, hinc, ac gradibus tardis
cum rursus periclitans, non aliter ac
manus palmarum necesse talia, non aliter ac
manus palmarum necesse talia.

B 2

Ova

Ovis coarctante stipulis serpentina, & ha-
sandra haec, sed gradienta carfota c. n., ovum
ovis similia, parant — Rarus, Ryle: ovum
strepente dentant; & nunculi serpentes vicos
epistulat latus; quia Virenae comae.

Adus moulle ovum ovum, circa haec
clolla dederunt, & premere mortui
vires Rilem in fas debas ovum Amphibi,
que ego non leg.

Attamen cum clolla haec a coliberrimo
Linceo inventa valde curanda sit, & cum hoc
Eudis plurimum placuit, moluam reme-
re, & sequente charactere conjugare:

Animalia frigida;
Pis, nuntique curia;
Palmos infra, sine duplicagrate,
& sine sine colla;
At vicaria gila, que alternam aerem
habet, & curia in palmos pro-
pella.
Ductile hybernata;
Non masticata, cibum integram deglu-
tum ardore digerentia;
Favem tolerata (per nectum sepe as-
per).
Copia die coherente;
Exuvii polia senectum exuvia.
Suspecta (colla omnibusque mammilla)
labita.

At

quam quod metamorphosin evolutam; et a metamor-
phose sine ulla tempore, habetis sine ulla aetate, & vi-
ditur; ac denique in omnibus formis metamorphosin
facit diversitatem. Hinc color videtur de
modo spectat, qui juncibus serpentibus, &
graculis accensum late consistit est, sed
per tempus capillare, ac denique primo ve-
stem, spectatque propriam rancidam quidem,
fuliginem solent; tales de natura laci in con-
stantia spectant metamorphosin maculae sunt, qui-
bus locula quod lacerat, & spectat distin-
guentur; tali est colorum major, minoris ac-
tutis, qui etiam obliquis, sed etiam cum
sua via spectat aetate redit.

- Sed sunt etiam certae, ac parvae notae,
quae haec testantur: tali est spectantur prima
figura, tum aetate; sed de capite figura ac pro-
portio; lingua bula, integre, lata, tunc, nulla;
segmenta seu squamulae, seu locula lata, cu-
mque figura, tunc; colorum laci; crura
cunctis, ac tunc; dentium aetate; corpora
adula magnitudineque, tunc, maculae, ac oculi
dorsales lateralesque sic; & maxime maculae
in illis collibus in spectant per aetatem, jam
vero locum.

Neque haec omnia, licet confestim, nota
quodam deinde, tali denique vultu
sunt, quod, qui haec continent, habet, mo-
dus, perinde ratione, metamorphosin, et
que etiam etiam continent aetate, distin-
guentur ab illis. Atque ita non modo spectant
nova, celeberrimo Linnaeo secundum delectat,
magnitudine spectant in Aetate, sed etiam
hic

ipsa species Linnaeus in plura sibi videbat
mutari, et deinde ipsi naturae, dicenda.

Tali modo curavit (pediculus Amphibio-
rum) species, multiplex operum sui, & qui-
dam parva; et vix intervenerunt species, ad
quas debent subsequenti experimentis colorem
(tributarius hoc sibi observationem, & Vp-
teribus. Aristotele, Theophrasto, Dioscoride,
Plinio &c. tradiderunt, qui cum naturam
evanescentem memoriae ceperunt utitur ca-
vere, quam habuissent maxime, & operari
causa Vix natura quoque intervenerunt reliquias
definit). Secundo: Ut incola sibi solida,
& primo quasi obitu dicerentur vacilla, qui
sagax operari, optimosque. Tercio: Ut me-
dicamentorum specificum habetur solida
pro diversitate species habenda, cum jam non
est numeratione colorum bilacillata, sed ex
differentia sibi in oculis incurvae inter-
natura. Quarto: Ut via de expeditur,
quocumque in sua terra cum, sibi mirabilis li-
cula experimentis volens credere, ad
observandum hanc gratulorum Medicum per,
tem.

—————

O R D O I. S A L I E N T I A.

Pedes possici saltatorii;
Corpus sine squamis; exuviae for-
ma musci;
Aures membrana testae;
Dentes nulli, ungues nulli (præter
pipam);
Genitalia nulla præter saum;
Metamorphosis cauda caduca.

G E N U S I. P I P A.

Caput planum, brevissimum, latum, an-
tice rotundo-arcuatum, corpori cuneatis-
sim; collo brevissimo ex parte paucissi-
mis; rostro triangulari truncato fossico;
fimbria reflecta; oculis transversis nan-
cis. Denti articuli tres, apice lo-
bati; pollice longissimus, membranis in-
divisus juxta, ungiculatus. Corpus oc-
ticulare planum, latissimum supra nigro-
squ-

spedientem; cute dura cartilaginea, tuberculis confecta, quae coarctationem inferantur, ut pullos recipiant. Pullos ex locutione dorsi peducunt, metamorphosi nulla?

I. Pipa americana. *Sib. I Tab. 77 et coloribus*
herpessata. Mercur. Surinam. Tab. 59.

Habitat Surinam.

Obi. Care regis Americanae in ditione qd.

GENUS II

B U F O.

Corpus orbiculare verrucosum, sordidum, setum; caput antice obtusum, rotundatum, supra gibbum; dorsum rectum; ac latera curvato-inflexa; pedes breves: hinc solitas cristas, amplexibus femellae in colla imperfectis; urethra jaculatoria. Ova in rana longissimum comata. Vita nocturna; haec, Colomque perole haec de die in haec obscuris; & protraheatur, papilla argillata in rana. Ad noctem vagantur, pueri (maxime plures) insistantes. *Haec differunt ab effluvia, ut sunt a salore, representant breviter, plures a papilla.*

II. Bufo cornutus. *Sib. I Tab. 72. fig. 2. a*
B. 3. a. a.

DIAGN.

Capite ingenti, antice retundito, thoraci circumscrito, illic amplissimo. Supercilia cunctis, macrisque, molibus, apice trilinea. Oculi in medio oculi separati.

Habitus Scorpionis. Juxta spem carum hospitalis in Museo Angliæ Cantuæ FRANCISCI ANNIBALIS TURRIANI Ep'i Ep'i. At absterge, horrendæ aspectus! dorso, fronsibus, una spina ferat.

III. Eulo brachialis. *Scor I 73. a. B. a.*

DIAGN.

Capite humiliori, macula rubra. Tarsalia subulata, verrucosa, setis glabra.

IV. Eulo pulchella. *Scor I, 74. a.*

DIAGN.

Dorso rufa apertis; postula dilate hirsutæ; hirsutæ, albiginesque dilate cinctis, notata setis.

Habitus in Italia.

V. Eulo variegata.

DIAGN.

Corporis setis, ciliatis. Hypochondria dilata tunda. Juxta procrasta. Rupa trilinea longit' hirsuta. Tarsalia humiliora, colli longit' hirsuta digula. Palma digiti setis hirsutis capta.

Ho-

*Habiat in India. Repreter in Museo
regis factus.*

VI. *Bala globosa.*

Diagn.

Capite indistincto, corpore circumdato; cor-
poris antea, undique tumido, convexo, tri-
gula, depicto, colore albo nuntioque va-
rio; tarsi dorsu castreo. Ictus, longioribus
h, strigis dentata, fronte subovata, pedi-
bus pollicis brachistylis latis.

*Habiat in India Orientali. Repreter in
Museo regis factus, Academiae Ugly-
bray, & Gervillae.*

VII. *Bala Scherborni.*

Diagn.

Capite, linea indistincta videntur.

Repreter in Societate prope Mongolian

a G. H. Scherborn.

VIII. *Bala vicia. Tab. I fig. 1.*

Diagn.

Maculae viciae distinctae, variae macu-
lae concoloribus, intercoloribus rubris,
intercoloribus brachistylis.

*Habiat in India, pro viciae macu-
lae distinctae.*

IX. *Bala citra. Rept. Tab. XXIV.*

Diagn.

Dracon.

Dorsum coluicis obreni, posuisti splendoris
de solis, continuo cecidit digestus, media
linea splendoris devictus; latera tunc non
quali lauda, ex rubro flavescere.

Habitat in turris latibet, terra rursus, in-
teritum tacit, ac foraminibus.

X. Bala salina. *Rapit. Tab. XVII. XVII.*

Dracon.

Cum levis, macula salina confusio non
pro leuissimis, derelictis maxime modo
linea dextra; interstitia abscissum, macu-
la circulo, et in latibet, & prope utram
articulos eleganter magis.

Habitat in paludibus; rursus in paludibus
in notum. *Palliat spolia, terribilis.*

XI. Bala vulgata. *Rapit. Tab. XXI. XX.*

Dracon.

Clavos. plumbos, turpes, tubercula re-
bella exasperat; supra regnum aequum
utroque praesentia nodis, resistentia.

Habitat in arboribus, sylvibus laetibus, for-
tissimi arboribus, sylvibus laetibus
maxime quatuor: tunc, ac media spolia,
et plumbos in paludibus impetentia.
Sylvibus in laetibus.

XII. Bala obdilatata. *Plu. non exp. terre
sua non.*

XIII. *Bala ignea. Rept. Tab. XXIII
XXII*

Diagn.

Super terreo-chloraceo, macula nigra: in-
fra albedo: conspersus punctis maculis
late minutis.

Vit. & abluens infra nigra; puncta macu-
laeque conspersa.

Habitat in paludibus castris Doublinensibus
aquarum copias; antennis utitur oleo, qua-
ritur in *Niederst.*, *indica f.*

XIV. *Bala maculata. Sch. L. 71. 4. 4^o 5.*

Diagn.

Dors. super et retro & clivus flavescen-
tes, maculae ad inferos variegatae; abluen-
tes flavae, nigrae macula conspersa.

Habitat *Sarmana.*

GENUS III.

R A N A.

Corpus elongatum, Rostr. longiusculum
regulatum. Caput elongatum, antea
compressum. Dorsum transverse gibbum,
sive spina ad lumbos asculata, tuberculis
dorsibus transversim positis. Ova conside-
rata transversim in acervum. Vita dura;
apricata in sole.

XV.

XV. *Rana margaritacea*. *Sab. L. p. 6. t. 7.*

Diagn.

Corporis ex latere rubro, granulis margaritiformibus, dilute subellatis, concoloribus; lateribus linea variegatis; abdomine albentis; granulis rubris carulis; pedibus alipatis; polnis tetradactylis.

Vari. β (*Sab. L. p. 1. 1*) corpore dilute latero; granulis rubris, polnis pentadactylis.

Habitat in Brasilia.

XVI. *Rana marginata*.

Diagn.

Corporis ovato-oblongo, supra latere, lateribus, latere postico, papillis minimis concoloribus; lateribus marginatis; plantis albis.

Habitat in India; legitur in Massæ regis facies.

XVII. *Rana maculata*. *Rafin. Tab. R. III. 1. t. 7. p. 15.*

Diagn.

Color rufus fulvus; macula oblonga nigra inter oculos & pedes anteriores; crura latere latiora.

Habitat prope terram paludibus inter Indiam, quae incoluntur acris deserta. Pissinat culicibus, rufus.

XVIII. *Rana conspicillata*. *Günther pag. 132. descript. des pag. 11. 4. t. 5.*

Diagn.

DIAGN.

Caeruleo-lutescit, verruculis asperis; dorso utraque turba totius longitudinis a lateribus distinctio; abdominis pallido; inguentibus nigra.

Vox: hostes suos compansum e longinquo percipit imitari.

Habitat in paludibus Europae vulgaris, sed fere tantum insularibus. *Rej. 56.*

XIX. *Rana cinnabata.* *Rej. Tab. XIV. 132. & 56.*

DIAGN.

Virens, maculae nigrae; oes elongato; dorso linea longitudinis latera caerulea occupata.

Habitat in stagnis. Fallit oves, quos exterruit.

XX. *Rana viridis.* *Sab. I. 71. 4.*

DIAGN.

Corpore cinereo, dorso quinqueangulo quinquestrato; maculae rubrae; abdominis, pedibusque lividioribus.

XXI. *Rana maris.* *Sab. I. 76. 1.*

DIAGN.

Scapula singula lente perflecto, corpore limboque coarctati rotunda testa, ano quadrifido.

Habitat in America.

XXII. *Rana venusta.* *Sab. I. 74. 4.*

DIAGN.

Diagn.

Corpore vesiculoso, maculoso, maculis con-
fluentibus, albis interpositis; pedibus digi-
tatis.

Habitat in India.

XXIII. *Rana pentadactyla.* *Sets. I. p. 3. 1.*

Diagn.

Corpore vesiculoso, maculoso, dorsibus
transversalibus, lateribus rotunda ocilla-
tis; pedibus inferius pentadactylis, digita-
tis, lobis laciniosis.

Vix. ♂. Corpore albo; digitis antecis quater-
tis cum rudimento quinti, pollicis quinti
cum rudimento sexti.

Habitat in India. ♂. Descriptus in *Revue*
Chirurgicale Comte Turrian.

XXIV. *Rana maculosa.* *Sets. I. p. 3. 2.*

Diagn.

Corpore vesiculoso variegato; summo dorso
oblique maculato; pedibus, digitisque lobatis;
lobis per partem approximatis, superius
confluentibus omnibus membranis palmaris.

GENUS IV.**HYLÆ (*).**

Corpus leve, parum; lobus mandibulae al-
bus, parotidum, densissimum, contiguum;
cro-

(*) Hylæ nomen Regulus, ab eo in Hylidæ positum, sed

crura postica longissima : hinc saltus ingens ; digiti scandentes apertius in articula viscosa plantæ, infra ora hirudinis delatibiles. CATANUS, 2 pag. 71. hinc *scelus sub scelo, agilis atheris, nec supra mercedem.*

XXV. *Hylemaniformis. Sôl. II. 13. 4.*

DIAGN.

Capite rotundo plano ; oculis prominentibus ; pedibus filicatis ; interdigis laevissimis nudis ; dente distinctissimo puto

Var. B. (*Sôl. II. 70. 4.*) *superius macula asperis.*

Habitat prior in Lemna. S. Sariceni.

XXVI. *Hyla viridis. Rept. Tab. IX. XXI. 6. pinguis.*

DIAGN.

Superiorem, infra albam, utroque latere laevi flavæ.

Var. B. (*Catanius Carol. 2. 71.*) corpore tereti, lineæ utroque flavæ, sed rubræ ; distinctus clunare dictæ, dictæ, dictæ, clunare clunatæ re, re, re.

C

Ha-

non postea latitudo, ut antea clunare hylæ hylæ hylæ clunatæ clunatæ clunatæ, ut apud clunatæ clunatæ clunatæ clunatæ.

Ut clunatæ hylæ clunatæ clunatæ.

Clunatæ VI. 40.

Quæ clunatæ clunatæ clunatæ hylæ clunatæ clunatæ clunatæ clunatæ clunatæ clunatæ.

Habitat prior in Europæ arboribus ; ß in America.

XXVII. *Hyla fusca.*

Diagn.

Corporis fuscæ, pedibus albis ad talos, & ad singulos digitorum articulos tuberculo-tuberculis.

Habitatur in Mass. Academiæ Upsalensî, & Friburgi in Germania thesauro.

XXVIII. *Hyla lutea.*

Diagn.

Corporis nigræ, macula lutea, femoribus, tibisque tuberculis; hypostomatus obtusis cuneo-fimbriis; ore amplissimo.

Vixit ß coloris supra consuetudinis tuberculatus.

Habuit prior in America; habitatur in mass. Academiæ Upsalensî ß in castro Petropolitano.

XXIX. *Hyla viridi-fusca. Jâruu Saruon. Tâ ß*

Diagn.

Corporis fusci, macula viridibus marginibus; pedibus viridi-fimbriis; oculo utriusque fere oculo viridi oculata.

Habuit Saruon.

XXX. *Hyla obscura. Sâu I 71. Fig. 1. & 2.*

Diagn.

Diagn.

Capite dilute lacteo, macula rubra; pedibus postice palmatis. Muc. con. cas. et rugos. in latere cili. velicam, ubi. alba, m. fel.

XXXI. *Hyia sumatrana*. *S* in *F.* 71. 3.

Diagn.

Corporis fuscis, et rufis cinctis; pedibus rufis, utrinque digitata. Muc. con. cas. et rugos. in latere cili. velicam, ubi. alba, m. fel.

Habitat Sumatra.

XXXII. *Hyia rubra*. *S* in *F.* 71. 3.

Diagn.

Capite nigro; rufis amplius; corporis rubra.

Habitat in America.

XXXIII. *Hyia isolata*. *S* in *F.* 71. 3.

Diagn.

Capite fuscis; dorso et rufis variegatis, utrinque cinctis.

Habitat in Brasilia.

GENUS V.

PROTEUS

Animal amphibium, branchiis & pulmonibus utrobique sicuti. *S* in *F.* 71. 3. respiratione aequam branchiis & pulmonibus.

C 2 Anolis

aerem pulmone hauriens : forte ut ex-
cisa palude possit alium querrere per con-
tinuam. Maxillæ ac digiti nudi. Cau-
da anceps. A cervice distat, quod bran-
chia, & pulmone sicut inflectitur, nec
faccillivo.

XXXIV. Protomuraena. Sals. Tem. I. Tab.
79. Tem. II. Tab.
Mura. Sereno. 71.

Dracon.

Pedes pollicis filicoril.

Habitus Sereno. Ductor metamorphose
abitus facit.

O R D O II. G R A D I E N T I A

Pedes quatuor gradientes;
lanceus abdomine a terra relevato.
Corpus collo, caudæque distinctis
instructum.

Tædigrada : lingua integra ; maxillæ &
digiti nudi, cutis alepidota albaque
squamosa ; sem rima longitudinali ;
ora glutinosa ; metamorphoses in aqua.

XXXV.

R E P T I L I U M 17

XXXV. *Proton titoria*. Tab. II. Fig. 1.

DIAGN.

Podas pedes gradatibus; capite pulchro, oculato; cruce brevi; dorsi pinnis membranaceis.

Habitat in lacu, qui est in alpe Egliser. Paratensem, ut ait fr. Gyrinus inveni in alpe fr.

XXXVI. *Proton ingens*. Tab. IV. Fig. 3.

DIAGN.

Podas pedes gradatibus; cruce brevi elongata, caudalibus impia; appendicibus brevioribus caudatis; cruce compressa, membrana ducta; oculis nullis.

Habitat varis locis in lacu Tjörnsörög Carabla. Specimen pro cruce, & delineatur character rursus R. P. HENWARTH S. J.

NB Qui potest, ingens hunc novum Gyrinus esse, ostendat animal inde caesa, qui aliter solum habitare.

G E N U S VI.

T R I T O N.

Corpus aquilif. tenes, subverrucosum, alpidotum. cruce compressa lanceolata, in aqua eleganter agilia.

C 3

XXXVII

XXXVII. Triton Gessleri.

Dracon.

Niger, punctis albis in abdome.

XXXVIII. Triton Warburtoni. Salamandrol.

24

Dracon. *

Niger, fuscis sordidatus.

XXXIX. Triton vinicola. Mantidiv, Gf
1891.

Dracon.

Capite globoso; corio nigro; latia macula.

Habitat Libia in paludibus apertis dracif.

XL. Triton alpestris. Tab. II Fig. 4.

Dracon.

Corpus atro tuberculato; abdomine cro-
ceo rubro immaculato.

Habitat in Egipto monti.

An eadem, quam Mantidivus invenit?

XLI. Triton caudex. Tab. II Fig. 5.

Dracon.

Corpus atro tuberculato; pila punctata,
abdomine maculato.

Habitat in praeceptis undecim, salubrisque.

NB. Statura duplo minor prior.

R E P T I L I U M. 29

XLII. *Triton sylvaticum*. *Sch. II* 137.

Diagn.

Corpus depressum flavum, albunusque, nigris distinctum maculis, latera rubescenda nigrescere vanaque.

XLIII. *Triton pubescens*. *Tab. IV* Fig. 1.

Diagn.

Corpus glabro; gula brevi mucositate characteris abducente subcorunda, dorso supra pino, utroque obtuse angulato; digitis brevibus.

Vix β tempore major: undequeque abque ordine rugo. punctulata, ventricosa.

Habitat pater circa Firmum in aquis stagnantibus β in Martuca; inspectus in Musio Terrano.

XLIV. *Triton cristatus*. *Alia regis Persicus* in 1793. *Tab. XV* Fig. 1 cum hinc descriptione.

Apud *Tab. II* Fig. 3 3. cum hinc etiam descriptione pag. 63.

Diagn.

Corpus spongioso nigrescente, maculis rubundis aris; gula hispida; crura glabra, punctata, utroque tunc et longitudo.

Habitat in paludibus. Oculi sub convexa in asperis intra β . venter Aët. Pers. Lc.

LINÆUS interrogat: an forte hinc hinc agilis? Insuper hinc? Ch. ut Fav in ci. Aët.

REPTILIUM. 41

GENUS VII.

SALAMANDRA

Corpus molle succulentum, cute splendens, luc fundente, absque squamis; caput utroque, dorsum vero alternis tuberculis; latera emarginata tuberculis transversis oblongis costiformibus, ut recubant, ut ob eam rem omnes has tuberculos recte mammillas appellat G. Macrourus in *Anal. der Sam.* 1747. Cauda articulata. Characterem bene expressit in *Fig.*, cuius postea WERNERUS *Salamandrag. Tab. I. Fig. E.* Skeleton spinae dorsi superne processibus tuberosi: costarum rem nisi rudimenta brevissima exhibet. Idem ibid. *Tab. III. viii.* & oviparum simile.

XLVIII. *Salamandra edga.* *Tab. III. Fig. 4.*
Diagn.

Corpus laeve, cauda compressiloba.

Habitu in tota laevior, & ad suspensum
transit, sicut huiusmodi Formae.

XLIX. *Salamandra caudata.* *Werneri Tab.*
II. Fig. 1.

Diagn.

Corpus toto albo, cauda subtesti.

Habitat Paetii. *Vivipara.*

C 3

L.

L. *Salvadora* *atra*. Tab. I. Fig. 2.

Diagn.

Atta tota immaculata.

Habitat in *alpe* *Exiliter* *Astruc* \S^o *Label*,
inter *Carathium* \S^o *Carathium*.

LII. *Salvadora* *maculata*. *Rajst.* *ex* *astruc*
astruc.

Wiesl. Tab. II. Fig. 2. *con* *lata* *boca* *de*
impacora *pag* 65.

Diagn.

Atta, *lata* *macula*; *macula* *perfecta* *ut*
aque *ad* *occulat*.

Habitat in *subalpinis*, \S^o *alpinis*, \S^o *alpe*
montis *subalpini*.

LIII. *Salvadora* *lata*.

Diagn.

Tota *lata*, *atque* *macula*, *atque* *glen-*
dore.

Habitat in *alpinis*.

Invenit *Coma* *apud* *Comentum*, *quam* *hunc*
procellis, *decus* *ex* *plagi* *lata* *dimana-*
bat.

LIII. *Salvadora* *fruticosa*. *Sine* II. 10. 4.

Diagn.

Stigma *virgula* *nodata*, *coloris* *distis* *rufo*;
corpus *distis* *carneo*, *macula* *lata* *distis*
distis *cauda* *distis* *lata*.

Habitat in *lata* *virgula*.

G E.

REPTIL IUM. 14

GENUS VIII.

CAUDIFERBERA.

Corpus nudum; caput, cruraque sensibile
line squamulata; digiti membrana natu-
ricoda juncti; aliove utrinque cristati, in
line latibentes. Cauda utrinque pinnata,
perit pro ratione caudae decrefcentis con-
tinuo decrefcentibus, ultima maxime, una
impati.

LIV. *Caudiferbera aegyptiaca*. *Sala H. 103. 2.*
Duvon.

Corpus fectio, bellato; pinnis caudalibus
cristatis.

Hospitatur in *Masse Petropolitana*.

LV. *Caudiferbera peruviana*. *Fredric Duvon*
Bat. H. 319.

Duvon.

Corpus atra.

Lingua integra; corpus parum, squa-
mula minutissima uestitum. Lingua in-
tegra, ses nalia. Anus varius.

GENUS IX.

GEKKO.

Tardigradus corpus totum testacine mi-
nutilinoque squamulatum, aequale, co-
ro-

ro-

40

GENUS X.

CHAMÆLEO.

Corpus totum sensuibus lachryque tuberculis squamiformibus testum; caput angulosum; occiput pyramidaliter subligatum; oculi maxillæ, in facie rugosissime arice perforatio ostiis contradi. Lingua longissima, transversam latens, lambriciformis; externa iridescentes maxillæ verrucæ. Maxillæ maxillæ; pedes omnes pentadactyli in palmas duas coacti; altera didactyla, altera tridactyla. Incessus ascendens; cauda incurva frangens; acies longitudinalis. Tardus sedet per multos dies in ceno inermis.

LIX. Chamæleo nicotensis. *Sole I. p. 1.*

DIAGN.

Capite squamato; occipite triplice; fronte compresso, carinato, rugula insignita; dorso, gubneque costis; loricis; corpore fuscato-castreo.

LX. Chamæleo Pancheston. *Sole I. p. 2. 67
4. 67 5.*

DIAGN.

Capite tuberculato; occipite tetragono planis dorso, costisque utrinque tuberculatis; costis nullis; corpore fuscato-castreo.

Habitat in India orientali.

LXI.

LXI. *Chamaeleon sylvaticus*. *Sets I 22. 3.*

Diagn.

Capite squamato, utrinque angulato, rhinopore; occipite trigono, postice embocto, anguli emarginati; corpore cincto; crista nulla.

LXII. *Chamaeleon africanus*. *Sets I 43. 4.*

Diagn.

Capite utrinque angulato, cristato; occipite reflexo cristato; dorso, cauda, pedibusque striatis; corpore maculato; crista alta.

LXIII. *Chamaeleon caudatus*.

Diagn.

Capite utrinque angulato, anguli acuti in latus embocti; occipite reflexo; dorso caudato cristato; corpore tuberculato caudato lino.

Hospitatur in Museo Torriana.

Det. Reliquae magnitudine naturalis.

LXIV. *Chamaeleon boettgeri*. *Sets I 43. 5.*

Diagn.

Capite utrinque angulato rhinopore; anguli, dorsaque serrata-cristati; pyramide occipitis lineatis; corpore colore albo, maculaeque variae.

GENUS XL

IGUANA

Corpus tardissime squamulatum; caput
culla stomale tectum; culla denique ple-
risque.

LXV. *Iguana chelonotica*. *Sets* L. 100. 2.

DIAGN.

Caput transverse angulato, longitudinaliter
bimarginato; canaliculata; cervice distincta
longissime reclinata, sculis ad medium oes-
ophi canaliculata.

Habitat in America.

LXVI. *Iguana leopoldi*.

DIAGN.

Corpus albo, culla utraque acute-ang-
ulato, culla longissima, stomatilis,
squamosa rugulosa, culla nuda, cui ro-
strum longitudinali pila.

Habitat in officina D. Haveri ad S. Tri-
nitatem in jubaribus W. adu.

LXVII. *Iguana cordylina*. *Sets* L. 107. 1. 8. 2.

DIAGN.

Capite convexo; occipite tuberculato, trans-
verse lobulato; dentibus caninis, collum
distincte despicit sparsa; culla angu-
la, aculeis verticillata.

Habitat in America.

LXVIII.

LXVIII. *Iguana silvanstrina*. *Sol.* I. 107. 3.*Diagn.*

Caput convexo, tacha utraque angula sub-
orbata; tacha squamula angustius subor-
bita.

Habitat in America.

LXIX. *Iguana chalcidica*. *Sol.* II. 76. 3.*Diagn.*

Dorsum curvis spinis pectatis, lateribus sa-
tura spinulosa; fronte nulla linea major; co-
cipis utraque tuberculosa. Aures singulae tri-
bulosa quatuor, ludo membranaceo, latera-

Habitat in Gallia.

LXX. *Iguana marina*.*Diagn.*

Gula pendula, membranacea, ludo os-
culis pila unice; dorso vero, undaque
longitudinaliter serrato; corpore tenax;
lipo levato, ludo vili.

*Habitat in Mysis Anglica Comitatus
Turrini. Pueri etiam pueri tui per
Mures in officina Dei. Hanc.*

LXXI. *Iguana delicatissima*. *Sol.* I. 107. 1. 2.

I. 107. 4. 2.

I. 107. 3.

I. 108. 1.

Diagn.

Gula pendula, squamula, minutissima to-
da unice; dorso vero longitudinaliter pec-
tatis.

Spinae lamella longissima acuta, fere per
caudam decurrenibus; capite pulice tubu-
rato, antice globos; collo supra nuda.

Habitat in India.

Habitatur in castris thysleri Turrisi.

LXXII. *Iguana tuberculata*.

DESCR.

Capite parvulo, squamis minutissimis testa,
antice, dorso vero longitudinaliter pedun-
tato, lamellis longissimis acutis, fere per
caudam decurrenibus; nuchalibus tubera-
tis; capite supra plano; collo aculeis duobus
obtusissimis datus supra utroque testis.

Habitatur in Agro Mayagüezensi Castris
Turrisi.

LXXIII. *Iguana colorata*. *Sab. L. 95. 3. ♂ & ♀*

DESCR.

Capite parvulo, squamis magnis interve-
natis; dorso longitudinaliter, & utroque
utroque parvioribus longissimis dentibus
peduntis; colore variis.

Habitat in India orientali.

LXXIV. *Iguana clamorosa*. *Sab. L. 109. 3. ♂ & ♀*

DESCR.

Capite brevissimo, gibbissimo; ocellis
beccati; dorso, caudae aculeis caudis
brevibus, utroque peduntis.

Habitat in India orientali.

D

GE.

G E N U S XII.

B A S I L I S C U S.

Ociput intra cutis membranacea, squamulis testa, pectata, conica, compressa, doctum, eundem omnia pectata radiata, squamulata, plicatili, quam, in arbore quiescentia, alterna complent, & explicat. *Habitus lymace, sed crassa infus ale dracinar adaequae interstitia inter utrumque genus.*

LXXV. *Basiliscus americanus. Setae I. 100 1.*

Habitus in America aspidati.

G E N U S XIII.

D R A C O.

Ala radiata ex lateribus secundam totam transi longitudinem utriusque cutis, squamulis micatissimis testa, later ventrali, seu subelli complicabiles; ingluvia pendula forma, faciei auct.

LXXVI. *Draco major. Setae I. 86. 3.*

Draco.

Cula tripartita, media compressa, inflexa, lateribus ovata, tuberculosa. Ala ad humera posita admodum; pedibus articulis liberis; corpore terribile.

Re-

Habitat in America, reperitur caeteris, aliis-
que ignotis membris. Hujusmodi Flum-
ina in Africa, Asia, Europa, America, Turcia.

LXXVII. Draco ruber. Sals II. 104. 2.

Draco.

Capit. simpliciter longa; alia ad pedes anticos
admixta; pedibus posterioribus liberis; cor-
poris transverse latus.

Habitat in America.

GENUS XIV.

CORDYLUS

Capit. cataphractum, corpus squamis
carnatis, carnis elevatis; murtica-
tum.

LXXVIII. Cordylus admodum. Sals I. 25
1-2. 2.

Draco.

Truncus subglobosus, supra murticatus; capite
triangulo.

Habitat in Mexico.

LXXIX. Cordylus luteus. Sals I. 104. 6.

Draco.

Truncus orbiculatus, supra murticatus; capite
admodum, brevis, globosus, utrinque angulatus;
verities transverse.

Habitat in America australi.

D. 2

LXXX

LXXX. *Cordylus fessio*. *Therap. her. Tab. CXX.**Diagn.*

Crura verrucositate melleoeri, squamulae densiusculis; capite, corp. atque mucronato.

Habitat in Oriente: Delos, Egypto, Africa.

LXXXI. *Cordylus venosus*. *Sib. I 84 3. U 4. Tem. II 61 3.**Diagn.*

Corporis livido, nigricante; squamulae transversae, interlobis, crura acuminata exstantibus verrucosae; oblongae transverso; cauda squamula oblonga cincta. anacanthi caelestibus; quatuordecim verrucosae nigrae.

LXXXII. *Cordylus basiliscus*.*Diagn.*

Corporis aequi, squamulae rotundae. dilute gryllae, udae; crura squamula oblonga acuminata caelestibus cincta; quatuordecim verrucosae apicibus; limbo postico squamula, crura atque corpora brevi, squamulae cauda interlobis.

Habitat in Asia Turrica.

Var. B. (Sib. I gr. 4) sicut ad humeros situm squamula. Ex Basilia.

GENUS XV.

CROCODYLUS

Rostrum longissimum, hinc rectus cinctum adnatis mandibulis; lingua nulla, sed ejus loco masculi maxilla inferioris admodum tumens, & valvæ elastica inter angulos mandibularum in fundo oris locata, gulam aperiens, atque claudens. Maxilla superior mobilis, inferior immobilis cum sermo otulata. Palpebræ converte, rugosæ; aures in globo extremi rostri; cilli corporis rugosus; cauda elevatissima, compressa, in substantiam corneam abeuntes, ut globo trajici nequeant. Alas longitudinalis rugosæ.

LXXXIII. *Crocodylus niloticus*. Sch. I. tab. 3. f. 4.

Enac.

Caput extensibile, sensu contractum in rostrum; nucha cumque dorsum inaequali, quæ lappæ dorsum seris longitudinalibus multiplex affectus; quæda compressa, superius extremit majoribus cristata; pollicibus triangulatis, apicibus pentadactylis, pollicibus tetradactylis, miculotrupes.

Habitat in India orientali, & Ægypto.

D 1 LXXXIV.

LXXXIV. *Crocodylus americanus*. *Sala I* 106.

DIAGN.

Caput subtriangulare, planum, testis contractum in coltrum; genae nuda; infra, duplici line curvata, unaque singuli interstitia per osdum excurrente, hac ad pedes posticos terminata; orisbus postici latio postici-antici margineato; digitis utraque quatuor, omnibus unguiculatis, postici multatis.

Habitat in America.

LXXXV. *Crocodylus sinensis*. *Sala I* 107. 1. ♂ 3. ♂ 4.

DIAGN.

Dorsis scutis quadratis plenis testellato; lateribus, eisdemque squamis ovatis imbricatis; cauda supra una, striatae crista curvata. Prebui uteri postrostralia; postici tetradactyla autistica, omnibus unguiculata.

LXXXVI. *Crocodylus terrestris*. *Sala I* 107. 1. ♂ Tab. CIV. fig. 1000.

DIAGN.

Capite subgloboso, corio communi obiecto, antice in coltrum cylindrico mollem longum uterato; oculis corneis formidinis. Corpore latus latus quadrato testellato, supra cilia tuberculata scutiformibus indio. Cauda supra circumcrista duplici, non cuculata.

REPTILIUM 33

fluente in unam. Pedibus cinctibus pentadactylis, quinqueunguiculatis scissis.

GENUS XVI

SCINCUS

Corpus totum induratum squamis seu denticulis, frontalibus, abdominalibusque cinctum luteum. Anus transversus. Collum fere crassius capitis.

LXXXVII. *Scincus officinalis*. *Sis II* 113.
3

Diagn.

Corpus apertum, compressum, cristatum; cauda corporis breviora conica, lutea squamis transversalibus. Dignis luteis, unguiculis parvis oblongis, squamis laterali luteis concolora testis.

Habitat in Egypte.

LXXXVIII. *Scincus luteus*. *Sis II* 114.
4
3

Diagn.

Corpus fasciculatum, depresso, luteum graciliter; cauda corporis multoties excedens; dignis concoloribus.

Habitat in Italia orientali.

Caractera: corpus parum; lingua bifida, serpentina, extensibilis, & retrahibilis

in folliculam; abdomen foveis subquadrate reticulatum; dorsum vero squamulis, seu granulis testum.

G E N U S X V I I

S T E L L I O.

Abdomen foveis quadratis reticulatum; caput imbricatum; corpus politum, nec muricatum, nec cristatum.

LXXXIX. *Stellio fovea. Seta II pag. 1.*

Diagn.

Corpus ovale, punctis albis punctis, puncta vertice in apicem, qui in verticem agitur, linealibus vix, dorsifoveis que in maculis notandis coarctatis, que in foveis transversis dispositae maculas superius corpus circumcingunt; cauda setiger.

Habitat in Zeylanda ad littora maris.

XC. *Stellio setiger. Seta II pag. 1.*

Diagn.

Alis. Latus; rostrum foveis alternis albis, nigricans; pedes punctato-maculati; dorsum oculis multiplex luteo transversis politis. Latere macula dentata.

Habitat in America.

XII. Scilio fucilla. *Sis* II 79 4

Diagn.

Capit. crassilima, cuncta; corpore ovato,
supra maculato, caeteris maculis sparsa al-
ba crassa.

XIII. Scilio fuscipennis. *Sis* I 101.

Diagn.

Corpore squamulis minutissimis fuscis
sparsis; pedibus crassis, albisque testaceis;
capit. tenui, in rostrum elongato.

Habitat in India.

XIV. Scilio testaceipes. *Sis* I 76 4.

Diagn.

Corpore ovato, albisque testaceis; lim-
bo dorsi albo rufisque fuscato; caeteris
extremis fuscis.

Habitat in Virginia.

XV. Scilio viridis. *Sis* I 75 4.

Diagn.

Colore viridi, maculis rufis punctatis; dor-
so utraque linea longitudinali alba intercep-
ta, transversaliter fuscis.

Habitat in Virginia.

XVI. Scilio thalassina. *Sis* I 110 4 8^o 5.

Diagn.

Colore thalassina fuscato, pedibus oblongis,
rotundisque apicibus fuscatis.

Habitat in India australi.

D 3

XVII.

XCVI. *Scilio punctata*. *Sis II. 9.*

DIAGN.

Caput ovato, parvo, indistincto; trunco
tereti, pingui, tubrico, linea duabus lineis
costatis exsertis; dorsum distinguens
a lateribus; senes & longitudinalibus par-
tibus laterum in ore dorsi, & totalem
in utroque latere; pedibus cunctis puncta-
tis.

Habitat in *Asia*. reliquis animal.

G E N U S XVIII

S E P S.

Caput cataphractum; senes pedes sub-
tus callosi punctati.

I. Abdomen subrotundum:

XCVII. *Seps senex*.

DIAGN.

Corpus atque venter, cuncta corpore
senes; dorsi plana.

Habitat in *Asia*. *Terrina*.

Col. Sufficiens senes distincti, & senes in
ter hoc & alii gener.

II. Abdomen senis subquadratis tessel-
laturam:

Oedipus senis abdominis octo.

Col.

Collarem indistinctum; pila rufa duplex;
cauda corpore transverſa; maculae longior

XCVIII. *Seps hermanni*. *Sets I 89 1. & 2*

DIAGN.

Tegula media dorsi, caudaeque lata caeruleo-
vireſcente, marginem lineam albido-caeruleo-
cento diſtinguens, hinc conſignis utraque
tegula cyanea, albis punctis variegata; ca-
llicem lineola, ſed albaque tenuiori impo-
ſita; latera nigra maculis conſperſa, ſub
albioribus veris albam.

XCIX. *Seps oxyrhina*. *Sets I 89 1.
& I 90. 7*

DIAGN.

Tegula media dorsi lata, alba, per lineas ma-
culata, ad caudam abſiſſa; tegula utraque
caerulea, albo-punctata; cauda albo-ca-
eruleaque-triſecta.

C. *Seps variegata*.

DIAGN.

Caput albo, nigraque vario; corpore et
rubello gryſeo; aure albidius circumſiſſa;
dorsu, pedibus, & cauda ſituate ſpaciola-
variegata.

Habitat in America.

* CL. *Seps maculata*. *Sets I 97 3.*

DIAGN.

Corporis nigro caeruleo, ſiſſis albis, ven-
tris,

nam, marginem ad infer, confusum, &
conjecta; notula rotunda utermina,

Habitu in Jodis.

Ordines fectorum abdominalium septem.

Collarium indistinctum. Gula rufa du-
plici transversal.

CII. *Seps laetitia. Seta II. q. 6.*

Diagn.

Alis, linea naves utraque ab apice costri
per dorsum ad caudam tendit; linea alba a li-
nae alba ad foveam postica; crura pallida;
ungues viri conspicui; palpi. tegula-
tyla.

Habitu in Zyphus.

CIII. *Seps blanda. Seta I. q. 4.*

Diagn.

Alis, linea alba, longitudinalibus octo;
femuribus alba punctata; palpi peritro-
tyla.

Habitu in Gubus.

Ordines fectorum abdominalium sex Col-
larium distinctum, labium splanchni
constrictum.

a. Collum splanchni labium adhaere; fovea se-
dei intermedius quadra.

CIV.

CIV. *Seps leucum.* Tab. II. fig. 5.

Descri.

Collata adnata; scutis intermediis quatuor; tota laca, denticulata, triseriata, subquadrata, falcata.

Habitat in fructu lapidis circa aquas.

CV. *Seps nigra.* Tab. I. fig. 3.

Descri.

Collata adnata; scutis intermediis quatuor; corpore quinquangulo ocellato.

Habitat in muris verticalibus.

CVI. *Seps murina.* Tab. I. fig. 4.

Descri.

Collata adnata; scutis intermediis quatuor; scutis transversis quatuor; corpore humilis, tenuis atque ad hanc thoracem firmata.

Habitat in muribus, radiatibus, appropinquat lapidibus pignus atque.

β. Collata squamata scutis scutis; tota scutis intermediis fibrata.

CVII. *Seps leucella.* Tab. III. fig. 1.

Descri.

Collata scutis; tota intermediis fibrata; corpore albo; utriusque serie macularum obliquo.

Habitat in terra lapidis plana.

CVIII.

Supra ventrem tum protuber.

Geoff. Ill. 14

Maxillæ dilatabiles, nec articula-
tæ; œsophagusque laxissimas ad
prædam duplo majorem ingurgi-
tandam.

Genitalia cœloga, vicino ano op-
posita.

Scandendo æqualibant.

GENUS XIX.

CHALCIDES.

Animal supra ventrem se promovens,
sed reptatum pedibus adjuvans.

CXIV. *Chalcides tridactyla* Cuvier. *Es-
plaf. 35.*

Diagn.

Pedibus quatuor tridactylis, unibus infra-
tis.

Habitat in Europa æstivæ, 5^a Africa.

CXV. *Chalcides puncta*. *Salm II. 68 p. 178*

Diagn.

Pedibus quatuor monodactylis; unibus
nullis.

Habitat in castris hinc fœci latetis.

Anguis bipes.

GE-

GENUS XX.

CÆCILIA

Corpus (absque squamis) nudum, sub-
rugosum. Cauda nulla. Anus sub, & post
extremum corporis.

CXVI *Cæcia testiculata*. *Anat.* I. T. XVII.

Fig. 4.

DIAGN.

Laticorpus rugosum, vix compactum; oculi
manifesti.

Habitat in America.

CXVII *Cæcia glauca*. *Mus. Acad. Phil.*

T. II. Fig. 1.

DIAGN.

Lunatus rugosus, rugis angulis acuto cor-
nibus ad oblongum lituram; oculi mani-
festi, nigrescenti ciliatis.

Habitat in India.

GENUS XXI.

AMPHISBÆNA

(Coluber à deux têtes).

Caput a corpore indistinctum, antice squa-
da testum; corpus politissimum, cylin-
dricum, æquale (hinc cauda non differt
a corpore) cute testum; cauda oblonga.

E

NB.

NE. Hujus generis serpentes solo attactu pedibus prelorentur in cute liqua, non solum Basilienfes retineant, sed & ipse Cyprianus observavit in ill. reg. Persia. 1701.

CXVIII. Amphibroma alba. *Mus. del. Fr. 14*
f. n. nuda.

DIAGN.

Corporis tota albo; macula nigra, supra
utroque longitudinaliter sita; capite lon-
ge vincto, in angustum oblongum rostrum
coacta.

Habitat in America. Hujusmodi in Musio
Basilienfi Cum Terris Fumis.

CXIX. Amphibroma vulgaris.

DIAGN.

Corporis albo; capite immixto; dorso
maculae fuscæ transversæ; lateribus, abdo-
mineque rufis, variis.

Hujusmodi in Musio Basilienfi Cum Terris
in Fumis.

CXX. Amphibroma varia. *Sis II 103.*

DIAGN.

Corporis albo nigro, sparsito, grylloque
vario.

Habitat in America.

CXXI. Amphibroma capillata. *Sis II 100-3.*

DIAGN.

Capite dilute fere; ceteris porphyreis
crispis.

R E P T I L I U M. 67

transversa super oculos; trunco et parpe-
na, violacea, de larva variegata.

Habitat in America.

CXXII. *Amphisbena ferox*. *Sch II* 73 4.

Diagn.

Caput larvæ; corpus albo, subaque va-
riegato.

Habitat in America.

G E N U S XXII.

A N G U I S (Serpens).

Caput a corpore indistinctum. Corpus
larvæ, cylindricum, seu utrinque aquali-
ter attenuatum, seu capite minime, et cor-
pore inde sensim magis incrassato. Cauda
obtusâ. Squamæ corporis superius imbri-
catis.

CXXIII. *Anguis hep.* *Mûl. Atl. Re. Tab.*
XXVIII. Fig. 3.

Diagn.

Corpus subaequali passim; punctis luteis in
spaciâ squamis, multiplici ordine longitu-
dinali; eveniente caudæ compressiori, le-
viori, distinctissima; pedibus ad latera sulci.

E 4

G.

* *Anguis in brevitate phloemæ habet, et aliquos
habet oculos lineares.*

capite brevissima subrotunda, maxillæ distichæ, parvæ.

Habitat in India.

CXXIV. *Anguis melanocephala*. *Sch. II* n. 4.

Diagn.

Corporis subcapiti glauco, puncto nigro in singula squamula multiplex ordinem.

Vix. *Æ. punctis latis.*

Habitat prior in India. Æ. Regiatur in Museo Turrico.

CXXV. *Anguis longica*. *Tab. V* Fig. 2.

Diagn.

Corporis subcapiti glaucum, nitidum, non lutea macula frontis, curvatoque, ex quibus due lineolæ subrotundæ longitudinali.

Habitat in pascuis montibus; nam ad trivium in rudratu.

CXXVI. *Anguis lutea*.

Diagn.

Corporis subcapiti nigrescente; capite super, dorsoque albo, distinctissimo; linea media a vertice incipit per totum corpus extendit.

Regiatur in Museo Turrico.

CXXVII. *Anguis edentata*. *Mus. Al. Em.*
Tab. VI Fig. 3.

Diagn.

REPTIL IUM. 65

Diagn.

Corporis subaequali, terete, asperso punctis
incurtis, subaeque angusta latus; cauda
longa breviora longioribus.

Habitat in America. Subtus effusa.

CKXVIII. *Anguis reticulata. Schenck. Phys.
p. 747 4*

Diagn.

Corporis subaequali, curvo - angusto,
quatuordecim costis albidioribus; abdomine
ex vivo albicante.

**Habitat Surinam; Injicitur in Mago Gey-
serum.**

CKXIX. *Anguis elvica. Geyser. p. 49.*

Diagn.

Corporis subaequali, curvo fuso; fronte
seno majore cordiformi.

Habitat China frequens.

CKXX. *Anguis leucosticta. Sjö H. n. 4*

Diagn.

Corporis subaequali, curvo - fuso; latera
fusa; costis, lateraque transversis albis;
nucha sagittata latera orificio lato, foramen
sagittata.

CKXXI. *Anguis amabilis.*

Diagn.

Corporis subaequali albis; fuscis fasciatis,
subtus concoloribus, punctis atomatis.

E 3

Ho

Habitat in Maflo Terrena.

Obf. Cauda fimbria dupli. hinc squammarum
induratarum.

CXXXII. *Anguis latata. Schenker. Pp. 8.*
Ar. 777. 1.

Diagn.

Corpore aequali tergilino, fimbria alba,
apex rotundato; caput fatis long. cauda
acutata.

Habitat Sardinia.

Obf. Abdomen & cauda fimbriata transver-
sa non continetur. Confusioem talis;
hinc a priori fatis diversa.

CXXXIII. *Anguis scytale. Mf. Ar. P. Tab.*
Pl. Pp. 2.

Diagn.

Corpore aequali fatis, sed fatis affixis
prima extremo ore, clava latilima ad va-
cium, fimbriata fatis angulata; re-
liqua parva transverfa, parva obliqua,
parva acutata decussata.

Habitat in Italia.

CXXXIV. *Anguis fimbria.*

Diagn.

Corpore aequali alba, fatis fatis tergilino-
ribus, obliqua concavata, fimbria to-
compilata, & confusata; oculis avila-
tis; capite latilimo.

Ita.

*Habitat in Mayte Dispersis Gaudis
Ternis.*

CXXXV. *Angia cinerea. Sca II 30. 3.*

Draco.

Corpore aequali, teneo, longior; felle
altius excedit, & fellea cuncta cun-
tam; capite antea fellea dupli, polle
umbro.

Habitat Surinam.

CXXXVI. *Angia corollina. Sca II 73. 1.*

Draco.

Corpore aequali, fellea corollina, fellea
dilecto rebus, in quibus apices spumant-
rum signi sunt, cuncta.

Habitat in Brasilia.

CXXXVII. *Angia atra. Sca III 8. 3.*

Draco.

Corpore aequali atra; fellea atra, in quibus
apices spumantium signi sunt, cuncta.

Habitat in Zeylon.

CXXXVIII. *Angia rufa.*

Draco.

Corpore aequali, rufa, fellea fellea, in quibus
apices spumantium signi sunt, cuncta.

*Habitat Surinam; habitat in Mayte Gey-
serum.*

71 T A B U L A

CXXXIX. *Anguis hepatica*. *Séniacii*. *Pap.*
fr. fr.

Diagn.

Corporis aequali; linea fuscis dorsali, laterali-
que fuscis parvis undulatis, hepatica, in-
tervallo hepatica, macula suboculanda alba
da

Habitat *Sericeus*, *hispidus* in *Mylo* *Gro-*
niensis.

CXL. *Anguis maculata*. *Mp. Ad. Fr. Tab.*
XXI. Fig. 3.

Diagn.

Corporis aequali, fere, fuscis fuscis later
luculentis, laterique dorsali fuscis longitudi-
nali decussatis fuscis, macula alba in ven-
tro fuscis crucis, unde totidem macula
late resurcit lateri.

Habitat in *America*.

CXLI. *Anguis decussata*. *Sén. I. 33. 7.*

Diagn.

Corporis aequali, fuscis fuscis rubris digro-
pudatus, in fuscis dorsali lateri cruciatis
fuscis, rubris ad suturem uni; pluribusque
fuscis, quae lateri cruciatis, unde con-
diti propere lateri.

Habitat in *Affrica*.

CXLII. *Anguis testacea*. *Sén. L. 200. 2.*

Diagn.

Corporis aequali crasso, fuscis numerosis,
ca.

R E P T I L I U M. 73.

totaque triplici; unde totam trifiditatem:
capite albo, fuscis maculis

Habitat in Paragaya.

CXLIII. *Aegus alba* *Muf. Ac. Fr. Tab. XDF.*
Fig. 1.

Diagn.

Capite triplice uterque, albo, immaculato

Habitat in Indis.

CXLIV. *Aegus haemorrhoidalis* *Brown. Jan. Tab.*
XLIV. Fig. 1.

Diagn.

Corpori brevi, sedis lacustis; spinosis
capitulum confectum, compressum et ab-
bato lividum. Submarginibus nigris re-
splendentibus; capite in rostrum productum;
cauda corporis duplo ciliata, obsoleta.

Habitat in America meridionali, & Africa.

GENUS • XXIII.

N A T R I X.

Caput cataphractum scutis latis, plagio-
plaxum, depressum, triangulare, nari-
bus pulchre distinctis, antice contractum in
rostrum. Truncus glaber, nitidus, pennis
caput angustior; medio: latera caput, &
femur cauda cristallina. Cauda conica,
elegans, attenuataque.

Fig. 2.

CXLV.

CXLV. *Nuxia longiloba*.

Diuron.

Corporis longiloba, equaliter cylindrico; apice distincto; ad occiput utrinque puncta regularum macula pallida obdita; corpore albo nigrescente, raris punctis luteis; obtusius equali cuneata.

Habitat in *Asyria rarer*. *Videtur pro experimentis non idonea.*

CXLVI. *Nuxia caudata*.

Diuron.

Corporis rotundiusculi, immixtae apicem puncta rotundiloba.

Habitatur in *Asyria Asyriaca Cauda*
Terrae Fossile.

CXLVII. *Nuxia variata*. *Mag. Al. Fe. Tab. XVII. Fig. 1.*

Diuron.

Ad occiput utrinque macula lutea nigra, luteola alba cincta, e qua utrinque albae excelsae cuneae, per totum corpus cuneatae.

Habitat in *Astoria.*

CXLVIII. *Nuxia rubra*. *Mag. Al. Fe. Tab. XII. Fig. 4.*

Diuron.

Corporis pyriformis, luteis punctis immixtae albae, utrinque ad obtusum bifurcatae; ad

1000

occiput, strong muscles, irregular ribs; low
nucha, tuberculate.

Holtzworth et al.

COLLE. *Mutina vulgaris*. *Sala II*, 4, Fig. 1.
a, g. 10. Fig. 1. a, g. (not a type specimen,
from the collection.)

Figure 1

Ha carrea, caride/basta rigniant; ad oc-
cupat stränge macula albo-lutea, que a
signa evaditur; macula in aetha inter priores
cum oppositis conflante; fœcia oblonganti-
bus fœcibus striatque macula fœciformi.

Var. β elegans-neralis; granis acris, lineis
non punctatis notatis.

⁊ Cerebra tricola utroque alba; media par-
te atra, cornu alba; abducent alba,
oculorum media atra.

Habitat: x pagina de divertis, fipitar, fiv-
matar, vafur, pratur. & qvfi mltos
fi y referantur in Aligto Aligto, fiv Co-
muni Tervent.

CL. North Carolina, 6th Ed. 19. 1.

En cuneo carulis; ad occiput utraque macula atrata alba, quæ a signis occipitis, inter priores media in medio cum apiculis confluit; abdomen nigrescente; tarsis duobus lineis transversis undulatis nigris.

CLII. Nareya kutanum Similium cornuella An-
fusa, et reliqua diversissima, de propriis
accidentibus precedenti.

CLII. Nareya Similium. *Ms. Al. Fr. Tab. II.*
Fig. 2.

Diagn.

Capite fuscis duplici nigra; corpore fuscis
albo nigrescit, nigra fuscis annulis den-
datis.

Habitat in India.

CLIII. Nareya Similium. *Ms. Al. Fr. Tab.*
XIV. Fig. 1.

Diagn.

Capite fuscis duplici nigra; corpore fuscis
albo, nigrescit nigra fuscis annulis duplici
interruptis.

Habitat in Asia.

CLIII. Nareya Similium.

Diagn.

Capite unice variegatoq; later oculis fuscis
brunis atro, corpore longissima, medietate
brunis latissimas; latus vero fuscis maculis
nigrescit, quae fuscis minoribus sequuntur,
in fuscis duplici; ultimo oculis, contra
fuscis, minime totum corpus variegata.

Habitat Concomite fere Julia; Insularum, in
Majore Turana.

Diagn.

Capite acuminato plumbeo; corpore laevi
conspicente.

Habitat in India.

CLVIII. *Natrix Aegypti.*

Diagn.

Supra levigatissima, setis, dentic. squa-
mularum distinctis subrotundis; infra ovi-
foliata.

*Habitatur in Aegypto Rhysingius Conatus
Turrioni.*

CLIX. *Natrix efformis. Aeg. Ad Fr. Tab.
XVII. Fig. 4.*

Diagn.

Corpore nigro, labris albo, angustissimo;
capite crassissimo. trunci multum excedente.

Var. β . Corpore supra laevi, linea setis utrin-
que post oculos orta, mox in angustis an-
gulis obliquis abrupta, tandem evanescente.

*Habitat prior in India. β descriptus in Aegypto
Rhysingius Conatus Turrioni.*

CLX. *Natrix fasciata. Aeg. Ad Fr. Tab. X.
Fig. 4.*

Diagn.

Corpore supralineato, carneo - caruleo-
to; squamis obtusis nequas raris; labris al-
bis.

Habitat in India.

CLXI. *Natrix Alsatia.* *Mus. Al. Fr. Tab.*
XXII. fig. 1.

Diagn.

Capite latius nigra fronte oculos; corpore flagelliformi; cauda viridi & nigra annulata; squamis terg. apice albis, inde fuscis transverfis; cauda petiolata.

Habitat in Als., America.

CLXII. *Natrix mysteciana.* *Mus. Al. Fr.*
Tab. XX. fig. 2.

Diagn.

Corporis flagelliformi. Squam. r. manifestis, cuneis-papilloformibus; capite angulato; rostre producto tetraedro; albae supra cuneatae; dorso utraque latus alba distincta ab eldorum, utraque macula caerulea rhomboidibus, in latus, quatuor duos oblique postrostrum excurrent, caeruleis; albae supra cuneatae; cauda petiolata.

Habitat in America; Pinnis hispida in Insulari Turana.

CLXIII. *Natrix flagelliformis.* *Satz II. 23.*

Diagn.

Corporis flagelliformi, supra caerulea nigra, infra viridicincta; capite angulato; rostre producto tetraedro; dorso utraque latus alba ab eldorum distincta; cauda petiolata.

Vas. B. (Carny Carolina n. 47) color nigra ex caeruleo viridicincta.

*Habitat prior Sarinensi; Vinctus insignitus
in thesauris Terracens. & in Carolina in
arboribus: insignis insueti.*

*Obf. Arma hinc, & precedenti speciei in mu-
xilla inferiori alba cum affinis; forte quod
hinc Caracorum venas abolvunt, reliquie
distinguit Loxotemus, insueti!*

CLXIV. *Natisa fabrica. Sola M 43. 3.*

Dyon.

*Corpore insignitum, splendens fabrica, al-
bo, infans nigra.*

Vic. & (Sola M 43. 3) infans rubra.

Habitat prior Sarinensi. & in Africa.

CLXV. *Natisa horrea.*

Dyon.

*Corpore nigra, alba maculis variegata pum-
da infans alba, nigrae cauda.*

*Habitat in Arabia, & Mexia. Fere
expers, homini antea Hyppocoris Me-
se Grenotiana.*

CLXVI. *Natisa pumata.*

Dyon.

*Corpore albo, maculis maculosis alba,
totum corpus spum.*

Hyppocoris in Asia Grenotiana.

REPTIL IUM II

GENUS XXIV.

GERASTES.

Caput cataphractum, scutis latè cataphractum globoso-ovatum, utrinque annulatum. Os atque rostro obtusum, rotundatum. Truncus Naticis, sed robustior, tior. Cauda crassa, obtusiuscula.

CLXVII. *Gerastes heros*. *Mé. de St. Pé. Tab. Pl. 1.*

DRAGON.

Caput, scutis albis, quatuor tunc oblique anteriora spectant; linea nigra per medium dorsum scutis superfundens; lateribus albis maculis.

Habitat in Asia.

CLXVIII. *Gerastes plicatilis*. *Sav. I. 37. p.*

DRAGON.

Caput distinctè foveolato; lateribus maculis macularibus-fatis, in unum lineam coherentes, utrosque oculorum; pedibus albis, quæ velle eadem lineam evanescit.

Habitat in Thracia.

CLXIX. *Cordus saxos.* *Muf. Al. Fr. Tab. XXV. fig. 1.*

Diagn.

Capite, colloque crustulato; dorso setoso-lanoso, diffusissimo; loricibus loricis.

Habitat in America.

CLXX. *Cordus rhomboides.* *Muf. Al. Fr. Tab. XXIV. fig. 2.*

Diagn.

Corporis caruleo-roseo, macula nigra, sub-rhombica; aperturis capulis, per loricem longitudo-nerale diffusis.

Habitat in India.

CLXXI. *Cordus agilis.* *Muf. Al. Fr. Tab. XXV. fig. 3.*

Diagn.

Capite ventre multicoloribus; corpore setoso-lanoso alba, & nigra, nigra punctis.

Habitat in Zeylone.

CLXXII. *Cordus Cobella.*

Diagn.

Capite ventre punctato; corpore lani; macula dorsali, ferruginea; alarum plumis, lineis macula dorsali cingente; loricibus maculis utraque pollicem margines albis.

Habitat in Maja Maja. Cordus Turrans; digit ceterum in America numerosissimus.

CLXXIII.

R E P T I L I U M. 53

CLXXIII. *Crotalus lacteus*. *Muf. Al. Ph. Tab. XXIII. fig. 1.*

Diagn.

Venter atro, linea longitudinali atque
 port alba, maculae geminae atrae.

Habitat in India.

CLXXIV. *Crotalus reticulatus*. *Muf. Al. Ph. Tab. XXIV. fig. 1.*

Diagn.

Corpus cinereo, fuscisque reticulatq; labiis
 albis; linea fusa nigra, transversa bo-
 vibus.

*Habitat in America, affradat rivas Indi-
 um, & Perupae.*

CLXXV. *Crotalus candidus*. *Sav. II. 13. 1.*

Diagn.

Corpus candido, maculae ruficincta nigri-
 catione, nigra, longitudinali; caudae apice
 nigra.

Habitat in Lybia.

CLXXVI. *Crotalus mexicanus*. *Sav. II. 13. 1.*

Diagn.

Corpus supra atro, subt candido; dorso a
 maculae fusc oblique candidae; post medium
 vtro fuscus lineatus, in quatuordecimquam
 maculas nigrescenti, variata.

CLXXVII. *Crotalus personatus*. *Sav. II. 13. 1.*

♀

P. 1.

Diagn.

Diagn.

Alutrinus; macula, postique integritas
caudata.

Habitat in area Hippocri.

GENUS XXV.

CORONELLA

Caput media fronte inter oculos clypeo
lucens, ex lineis majoribus polymorphis
in figuram subovatum confectis, qui
major capitis pars obsegitur; latera vero
de occiput utrinque squamulis imbricatis.
Corpus Narica, seu Cauda.

CLXXVIII. Coronellastrica. Tab. F. fig. 1.

Diagn.

Ex cinereo cinereo-rufa; maculae dorsali
alutrinis distincta.

Vit. 3. (Sider. 3a 4.) Septa caudata rubore
ficta, sicuti alba; maculae dorsales al-
utrinis coloratis.

Habitat prae vulgaris area Fictum; et
ex Africa.

CLXXIX. Coronella caudata.

Diagn.

Scutello cinereo; corpore cinereo-rufa; a-
cuta alba; papilla caudata, quadrupli
re longitudinali; interstitiis minoribus.

Vit.

Vae. β *S&H* II. 1. 3 β β 2. Scutello rufis flavo-
oculis corpore rubello, oculis coeruleis.

Habitat in Africa. Invenitur in Asia
Tartaria. β in Sibiria & China.

CLXXX. *Crocodylus falcatus*.

Diagn.

Scutello carinato, linea rufis falcis
corpore albo - carinato, linea falcis-
nigra, quae haec duo longitudinenter
dividunt.

Habitat in Africa. Invenitur in Asia Tar-
taria.

CLXXXI. *Crocodylus torquatus*. *S&H* I. 33. 6.

Diagn.

Capite rufis; corpore flavo, linea falcis-
torquatus cauda.

Habitat in India orientali.

CLXXXII. *Crocodylus agalensis*.

Diagn.

Albus, falcis falcis integris, falcis obli-
que concurrentibus, tota dentibus ana-
tis.

Invenitur in Asia Tartaria.

Obi. Similis angui falcis, sed dentibus di-
versis.

CLXXXIII. *Coronilla virginica*. *Sals* *F* 75 p.

Diagn.

Suturis *fulca*, *fuldis* *luteis*.

CLXXXIV. *Coronilla luteola*.

Diagn.

Corpor *levissimum*, *divis* *subulente*,
fuldis *ratis* *albo* *subulente*; *radice*
depresso *plagipata*.

Var. β. *Intervallis* *fulcarum* *minutis* *styp-*
tosis, *fuldis* *prope* *albicans* *subulente*,
condensatis.

Hypocistis *in* *Mayo* *Turman*.

CLXXXV. *Coronilla cerasoides*.

Diagn.

Co *pore* *levissimum*, *albo* *subulente*;
maculis *divis* *subulente*, *scriptatis*
hanc *longitudinal* *hanc*, *decidibus* *crypticis*,
una *leve* *posita*; *capite* *subgloboso* *magno*.

Hypocistis *albus*.

CLXXXVI. *Coronilla tenata*.

Diagn.

Suturis, *interbusque* *fuldis*; *albo* *subul-*
ente, *interbus* *hanc* *divis* *fuldis* *chil-*
issimis; *radice* *depresso* *tena* *starna* *fulca*;
capite *subgloboso*.

Hypocistis *albus*.

Ha *tres* *species* *mutis* *affines* *sunt*, & *leve* *con-*
stant.

CLXXXVII.

CLXXXVII. *Cornelia typura*. *S&M* 13 a.

DRAC.

Capite luteo maculato; corpore toto maculato.

Habitat in Arabia.

CLXXXVIII. *Cornelia testacea*.

DRAC.

Corpore toto super nigro, subaque albato testaceo; subtus atro, utroque maculis albis squamulosisque irregularibus; capite elongato.

Habitat in Sypide, vulgo Cury; legitur in insula Turrica.

CLXXXIX. *Cornelia petola*. *S&M* I 32 4.

DRAC.

Capite luteo, maculis oculi, caudaeque luteis, intermediis utraque desquamulosis, supra confluentibus.

Habitat in Africa.

CXC. *Cornelia atroca*. *S&M* II 82 a.

DRAC.

Subtelle fronte macula, quadrate maculae atrata. Corpore maculato, luteo dorsi, utraque macula subcaudae, testis rhomboidibus, medio corpore dorsi rhomboidali-uncavatis, irregularibus rubris.

CXCII. *Conopsea cervina*. *Sils II 79. 3.*

Diagn.

Alba, vertex utroqueque extremitate nigro-
flavescens; in medio vero corporis nigro-
punctata.

Habitat in America.

CXCIII. *Conopsea calva*. *Sils II 73. 1. 8^a 1.
8^a 2. 8^a 3. 8^a 4.*

Diagn.

Alba, sed squamis incutis nigris quatuor in areolas distincta.

*Habitat in America; maribus, glaciisque
insidet, ut in Europa fit.*

GENUS XXVI

B O A

Fronta convexa, tuberculata; rostrum
valde plagioplatum, depressum, ro-
tundatum, antice scuto cingitum; qua-
si ad latera, inque parte postica rotun-
do, scuto radiatim cincto; labrum superius
reticulatum emarginatum; labris inferio-
ribus, scutibus excavatis. Dorsum te-
niculis transversis, subundulatis, nonnun-
quam interruptis conspurcatis venarum
nervosa; antice vero tamquam puncta,
ab

REPTILIUM. 89

altera; latera immaculata; habitatio in arboribus.

CXCIII. *Bos thalassia*. *Mé. M. Po. Tâ.*
III. Sép. II 96. a.

DRACON.

Capite fibrillo; corpore vixit thalassia
draco; labia, maculae dorsales car-
datis.

Habitat in America.

CXCIV. *Bos variegata*. *Sép. II 97. a.*

DRACON.

Capite fibrillo; corpore variegato hec-
do; labia draco rubentibus; macula dor-
sibus draco fava, marges luteo rubra.

Habitat in America.

CXCV. *Bos rufus*. *Sép. II 94. a.*

DRACON.

Corpore ut rufus draco; labia lutea;
macula dorsibus albicantibus; marginibus
rufa.

Habitat in Imperio Siam Asia.

GENUS XXVII.

DIPSAS.

Caput latum plagioplatum, cordatum,
gonde, cataphractum, distinctum.

F 5

Trac-

Truncumque a capite multosque anguliflor,
cathetoplateus, compressus, anceps, vo-
lubilis, utraque acie fatis majoribus
transversis. Cauda vixit, undique im-
bricata.

CXCVI. *Diplo indica. Sals I. 43. 4 & 5.*

Draco.

Caput albe, rufoque varia; corpore de-
his spediore; latibus fatis fiderem,
albe proclat; pote abdomen papila si-
vet truncata.

Habitat in Zeylona.

GENUS XXVIII.

NAGA

Caput enaphaeform, ore retuso. Tho-
rax, sive anterior pars trunci inter scu-
tum 4 & 12 abdominalis cutis, dum laci-
ditur, in orbem planum, seu aliam
spatiam longitudine extendit, non ab-
sine alia figni volunta, dum fatus
fuit. Medio inter hanc dilatationem loco
oculis anterioribus vixit inuenta fere si-
gna aliqua, ut plurimum unoculi, que-
les fensit in vixibus habere, et co-
lore albe diaphano, margine nigro pla-
gite.

CXCVII.

CXCVII. Naja latifrons. *Sib. I* 44. 1.

Diagn.

Peripetio fuscus hinc inde rufescente; corpore cinereo-luteo aequali.

Habitat in India orientali.

CXCVIII. Naja fulvata. *Sib. II* 89. 3.

Diagn.

Peripetio uncinatus rufescente; corpore cinereo-luteo; fimbriae fulvae rubrae, undique cinctae, quatuor lineari.

Habitat in India.

CXCIX. Naja brevicauda. *Sib. II* 89. 4.

Diagn.

Peripetio subcordiformi, maculae quatuor atrae indistinctae; corpore rubro; fimbriae rufae fulvae distinctae.

Habitat in Borneo.

CC. Naja sumatrana. *Sib. II* 89. 5. 1.

Diagn.

Peripetio uncinatus rufescente; corpore cinereo-fulvo; fimbriae dorsales rubrae.

Habitat in Superio Sum, 8^o Insulae Ternate.

CCI. Naja maculata. *Sib. II* 90. 1.

Diagn.

Peripetio uncinatus rufescente; corpore luteo rubro; fimbriae squamulae albae maculae.

Habitat in India.

CCII.

Optime ab hoc crepitaculo character defumitur, qui saepe tanquam mordet, nisi mox prius crepitaculo bonitatem edocet de periculo. Secretorum articuli singulis fere annis: hinc claudens articulus statim designans, nec spodem. Caput accedit ad genus colubinum, sed gibbum.

CCIII. Caudina testacea. *S&P* II 95 1.

Diagn.

Corporis curvis squamularum crepitaculo (non) claudens fere, (non) spodem; macula dorsi rhomboidibus nigra, et nigra fere, alba lineis claudens; apertus subventralis, per lineam dorsi, caudamque continuatur.

Habitat in America infra gradum circ. 45; inde Alura fere exstirpatur nonnulla.

CCIV. Caudina testacea. *Caudy* Tab. XII.

Diagn.

Albo, fereque variis; macula rhomboidibus nigra, dorsi alba.

Habitat in America parte arbori, maxime sub truncis caducis, quibus infra fangulae saepe sunt arbori, qui pedibus variis cande arbori et maxime.

Antilopea Solitudo de Antilopea Ameri-
cana.

CCV,

CCV. *Crotalus Gronovii*. *Mf* n. 49.

Diagn.

Corporis & capitulo compressis cathartoplium; capitulo corneo, utrinque sua longitudine exarato, indiviso.

Habitat in America.

CCVI. *Crotalus Dryinus*. *Descript. Annot. Ar. I* 177.

Diagn.

Corporis crasso; molle flexuosisque pecti.

Habitat in America.

CCVII. *Crotalus scutulæ*. *Sola II* 96 1.,
U n. 95 3.

Diagn.

Colore cinereo later, in rufam vergente, nigro fuso maculisq; squamis. Angui res, vix se contrahentes, huiusmodi adhaerentes.

Habitat in Syria.

GENUS XXX.

COLUBER.

Caput plagioctenium triangulare, pedice ductum, depressum, lateribus compressum, hinc juxta maxillam superiorem utrinque angulatum, antica pars setis, naris

nates & oculos comprehensura scutis
emphraista est, quantum tres, quæ ocu-
los interfecerit, maximæ sunt; verum
postica, & maxima capitis pars squa-
mis imbricatis; maxilla pollice utraque
protrudens. *Truncus Natrix, seu Ce-
rastes (*)*

CCVIII. *Coluber foliatus. Muf. Al. Fr. Tab.*
XXII. Fig. 1.

Draco.

Capite emulso; dorso luteo duabus
striis longitudinalibus; latera obsolete
lutea.

Habitat in America.

CCIX. *Coluber vacans. Muf. Al. Fr. Tab.*
XIX. fig. 3.

Draco.

Albus, sed capite triangulo supra oculos, &
duplici puncto vertice luteis; dorso macu-
lis punctatis lutescentibus, totam partem superio-
rem occupantibus.

Habitat in India.

CCX. *Coluber fuscus. Tab. I. 14. 4.*

Draco.

Capite albo, corpore dilute luteo; macula
trunc-

(*) *Coluber venosus* ab ipso videri videtur breviter
descriptus in *Truncus*.

transversis, in medio dorso truncatis,
rufa subtruncis diffusis.

Habitat apud Hottentotos

CCXI. Coluber degustiflorus. *Sol. I. 81. 9.*

DIAGN.

Albus, sed fons cruce rubra, maculae de-
cussatae rubrae pingui; dorsum triplici serie
quatuor subtruncis intermediis tenuibus;
latus serie solitaria macularum rubrarum.

CCXII. Coluber Joviani. *Sol. I. 82. 2.*

DIAGN.

Albus, sed macula fusa-rufa transversa-
te arcuata, alba per oculos; synclipsis effu-
que tria longitudinalia, per anteriorem dorsum
partem extensam; media, postea per dor-
si parte macula rhomboidalis alba al-
cant, latiuscula sinuata, irregularibus,
inquantibus; oculibus dorsibus.

Habitatur in Majo Magistro Conde
Turris.

CCXIII. Coluber ignobilis. *Sol. I. 92. 6.*

DIAGN.

Caput cinereum-fusum; maculae dorsales
subtruncatae, coarctatae in tertiam articu-
larem utraque serie posturam, quae sit
opposita, et cum macula prima interve-
dit stant.

Habitat in America

CCXIV.

CCXIV. Coluber chelca, *M. Smith an 1749*

Tab. VI

Diagn.

Squamae cristatis; capite a naribus lineis ad oculos oculos squamulis albis, lineis maculae dorsalis, nigrae et dorsibus rugatis; ad nucham quadrifidus, reliqua constrictus in crenam continens rectam; colore corporis fuligineo, macularum nigro; linea abdominalibus latissimis.

Habitat in Corymbis, abrupis fruticibus depressis Senegalibus, Senegal, et maribus agri Gyalensis, ubi a quatuor regibus innotet, quatuor praeceps atque.

Anteriorum hodie detectum non est: Liberum in sinu Senegalis occurrere habet temerem, ab hac vipersa demortum; obducatum oleum alvum in praecipua castra Anglorum doli. At infelix mater capta est nuda olea non sicutum in macula huius speciei.

CCXV. Coluber sepi, *Sels I 13. 7.*

Diagn.

Corporis nulloq. dorso tunc duplex salina, ta, angulis sepe fluctuantibus.

Habitat in Africa.

CCXVI. Coluber baras, *Primer, *ibid* pag. 17. n. 104. vel Tab. II fig. 1.*

Diagn.

Corporis cinereo (senilis), et fulta nullo
G (ma

(man); testa dorsali tæni fulminata, utraque pariete albis. corpus linea respicientibus, atris.

Viii. *B* (Sito II 9. 8.) angula lateri dorsi subrotunda, levitate fæcis, sequens subconfluentibus intersexis undulata interrupta, inaequalis, extrema cordis transverba, bidentibus apiculata.

Y (Sito II 36. 1.) capite truncato, pollens inflexus; collo gracili; corpore subululo; testa fuligine nitente speciosa.

Z (Sito I 13. 3.) angula angula occipitis ac ex maculam albam incipientem, infra oculum vagantem; tæni dorsaliro speciosa, medio fulminata, versus medium dorsi extenuata, et versus partem ex macula rotunda coherens bene constantem.

a (Sito II 39. 1.) angula capite multipartita irregulari, tæni dorsi dente fulminata, angula obtusa macula lateribus subconfluentibus, inflexis lateribus sine punctorum notam depicta.

Habitus a. vagans in Europa. In Sicilia apud nos pro opere agnatus ad thymum.

β. Ex Italia orientali supra tota dila.

γ. Ex Insula S. Eustachii.

δ. Ex Italia apud a.

ε. Ex Insula Corcyra.

CLVII. C. *Leucopis Andromæ, Peron.*
Alq. 13. 17. a. 104. 105. Tab. IV. fig. 1.

DIAON.

DIAGN.

Corporis tota aetherea immaculata; squa-
mae haecolatae, cetera longitudinali adspersa,
libas punctis albis, nigrescit variata.

Habes in Europa passim, digne agnoscit
agnatam pro typica.

Aristoteli repertum olim ceterum ad Thron
fuit, & ceteris talia quidem laudat. At
in Aethia fuit videri orbi.

GENUS XXXI

V I P E R A

Caput, truncus, labellumque colubri. Dif-
fert defectu scutorum in antica oris parte,
sed totum hinc caput squamulae mucosif-
icis imbricatur. Oculi in lateribus capi-
tis triangulari quondam lateribus sit, sub
scutello, seu limbo protractioni, qui ex
hodem regula, utique subscutulus educit-
ur (*).

CXXVIII. Vipera Prædicta Redi. *Alb. sep.*
113. 116.

DIAGN.

Nuda venter; corporis tota truncata, haec

G 2

vi

(*) Vipera hinc est aqua & aqua, ad Colubri,
Serpentis, &c. maculata. At illi colubri, & de
viperis. De hinc est aqua & aqua. At illi colubri,
Serpentis, &c. maculata. At illi colubri, & de
viperis.

vires, stromis, quadruplex serie longitudi-
nali, intermedias utraq; confusantibus.

Habitat in Aethiopia Aegyptia, Et Italia.

Obs. In plerisque officinis Rorae Nepeli re-
cordis additur ad compositionem diuina-
m (*); verum Rorae Aegypti Cleopatrae ex
Aegypto. Verum quidem in hunc collu-
cium, hoc facile exhaustibile. Prognosis
hinc, et validissimum cito et sine periculo-
sus. Aspidorum a me et expertissimo Do-
mine College Warrum detectum gerens,
et rursus generat.

CXXIX. Viperæ Melle Chama. *Experimentis
de la Figue. Tab. L. L. L. L.*

Diagn.

Nalcoria; (***) corpus trile chondri-
formibus alius sparsis; lobus Chalybe
punctis fere.

Obs. Hac viperæ officinarum Galii pestem in
im. habet, hoc viperæ exhaustibile est; An-
talyx detectum in armis et clatibus et Chama
L. C.; idem cum oleo essentiali locust
arboris et Jussieu. *Anal. des Simples*, 1747; et
sparsis necnon hinc ab Abrahamo Boer
in *Art. Sec.* 1748.

Ho.

(*) Ipsi Antichama detectum hinc hinc viperæ in
hunc viperæ est, quatuordecim partibus ex quo nar-
rat de choma.

(**) Officinis utique hinc nam talis est, per partem
antichama, et talis melle hinc.

*Habitat in Delphacis, et apud Lagidunjs
& Hilarinjs.*

CCXX. *Vipera Hyrcia. Almonas* *Arp. 189*
hinc ! propter caulem tenuem, quam non
bene nescit,

Diagn.

Nascentis; deinde citius macularem, mac-
ulosemque obliquis, angulis aculeis
conspicuas,

Vena. fulta.

ß. pallido-caruleo.

*Habitat in Myria montis, maxime circa
Castel de Damm. Inde semper narrantur
translati in Alpibus Tormas.*

*Fit in officina Germana proinde cum Ro-
dano ad theriacem adhibetur. Venenum
theriacem auferre solet, sed infidendum
sunt experientia.*

CCXXI. *Vipera carulea.*

Diagn.

Caput albo-caruleo, macula u-
traque magna elliptica rotunda; vena
alba utraque post oculum crata, quam sub-
do alba, supra alba lineola terminat; macula
nuda ferruginea brevis.

Habitat vulgaris in Martena.

*Reperitur in cava Alpibus Corbis
Tormas.*

CCXXII. *Vipera maculata.**Diagn.*

Corporis cinereo, maculae margine fuscis,
 dorsi pellice laevi, compressibiles bene tri-
 angulares, dorsales dyptera triplex
 lineae, media major; capite compresso,
 interbas alio, supra cinereo, lineis utri-
 que fuscis, ante oculos profundius con-
 currentibus.

*Habitat in Monte Rhyngni Conventu
 Turrani.*

CCXXIII. *Vipera bella. Sals II 16. 1.**Diagn.*

Color cinereo-lavio, alio de rufa varie-
 gato, transversis fuscis fuscatis; abdomine
 laevi, cu termino utriusque parit albam
 maculamque squamularem laevi

Habitat in Braggia.

CCXXIV. *Vipera maculosa. Sals I. 34. 1.*

linea; capite capax, qui affinem parit
 refert.

Diagn.

Corporis lineis fuscis reticulato, areola
 plumbis.

CCXXV. *Vipera venosa. Sals II 64. 1.**Diagn.*

Corporis supra rufa, capite, cuticula
 squamularem alacutibus; alacutem la-
 va, infra maculosa

Ha

R E P T I L I U M. 103

Habitat in arboribus insula S. Crucis.

CCXXVI. *Vipera* nov. *Abf. Ad. Fe. Tib.*
XXII. *Fig. n.*

Descript.

Corporis ovatus; facies alba; squamularum cinctus elevatis.

Habitat in Asia.

CCXXVII. *Vipera* color.

Descript.

Capite elongato, triangulari; corpore toto fuso, compresso; dentibus cinctis; squamulis cinctis majoribus.

Habitatur in Maja Terrana.

Oculi dentes nobiles venendi in sereno latere, infra aqua ad supra, huius; hinc vena coloris, sed squamulis cinctis planis.

G E N U S XXXII.

C O B R A.

Caput squamis lubricatum. Oculi in superiori capitis parte sit. Squamulae corporis cinctis, laevi, squarrosae, nobiles radiatae.

NB Vitis huius squamulae aptat, & fructu mola huiusmodi docet de periculis, ut Cradilem exceptatulo. Squamulae cinctis aptatulo cinctis, hinc virogo cor-

G 4

para

capite : squamis alba densa, albi raris.
Dentes molares vincti in sagulo lateri,
infra aqua ac supra, bini.

CXXXVIII. Cobra Clada. Sile II 33.

DRACO.

Capite infundibulo; corpore squamis de-
cibus magis rotundo, densi colorem ful-
vum, raris vero livum exhibentibus, va-
rio; cunctis in parte media sagis, immixti
candem, inter oculos.

Habitat in Zeylone *Is^{la} Caba*.

CXXXIX. Cobra Lachela. Sile II 34 a.

DRACO.

Capite infundibulo; corpore squamis de-
cibus magis rotundo, squamis albis,
densis nigricantibus, raris vero conspur-
colorem exhibentibus, vario; cunctis im-
maculatis; linea nigra transversa per
oculos.

CXXX. Cobra Anopas. *Atj. Al. P.*
Tab. XIII. Fig. 1.

DRACO.

Capite cordato, glabe, difundito; macula
atra 4 line plicibus; squamis heteroclitis;
coloris casti; maculae fuscis, marginis ro-
tundo, albo marginis caudis, quadratus
sine spina.

Habitat in America.

G E N U S XXXIII.

A S P I S.

Caput squamulis minutis imbricatum,
globum secundum alios Lucani

Aspidem pumilam nuda serice . .
Pharal. 9.

oculis superne fixis. Corpus nitidum
squammis planis appertis, nec cari-
natis.

CCXXI. *Aspis Chaptaliae* Desfont. *Hist.*
nat. Serp. p. 14.

DIAGN.

Caput brevis, inter oculos depresso, postice
striisque ciliis; corpus ex limbo al-
bido, minutis ferrugineis aspersis; ca-
uda extrema bifida, lobos nigrescentes
cauda.

Habitat in *Aegypto*, eade mensura *Aegypto*
Regiae videtur; nam quotiens accipit
Romanis pro confusione dicitur; Jam
Lucani imponitur.

. . . *Nigra* non nuda serice.

. *Ide* pumila.

. *Pumila* aspidem nuda.

Pharal. 9.

CCXXXII. *Alpis lobella*. *Sets II. 3.*

Diagn.

Capite elongato; corpore ex dimidio rufis;
vires alba concolora.*Habitat in Austria.*CCXXXIII. *Alpis variegata*. *Sets II. 3.*

Diagn.

Corpore super et fuscesco, gryllo, & albo
variegato; lateribus, & labris latis.*Habitat in Austria.*CCXXXIV. *Alpis inflexa*. *Sets II. 3.*

Diagn.

Corpore apertis tenui; linea longitudinali
dorsi, & laterum; dorsali ante oculos in-
flexa.*Habitat in Africa.*

G E N U S XXXIV.

C O N S T R I C T O R.

Caput squarrosa tuberculis compressis in-
vagatissimum. Frons emissa, medio
filicincta. Oculi speciosi. Orbis fron-
tis prominentis fornicata. Rostrum con-
cavatum. Naribus juxta productis ovata.

Ades.

Adoque caput vero cuspis ventrici. Cauda brevissima obtusa.

Caput longius, per viciniam totius cervicis et i. unius, confringendo fissatur, latera ciliis degliscit. Præter integram cervicem caput, ut cornu, adiacet ut ore posticiis, videtur Perognathus.

CCXXXV. *Geophis formosissima*. Sols I
p. 3. 3 *Land America*. I 17. 3.

Diagn.

Macula magna flavo-olivacea, unicoloribus, ciliisque, utique posticeque emarginatis, per intervalla fuscum ductum concentricum, utraque linea longitudinally recte curvatur, hinc inde, cunctaque tota oculis, pupilla intricati tepo, maculaque elegant variegata.

Forma (Sols II. 101.) fides oculorum rhomboidalem in utraque latera, quæ medius tenet cum raro circumstantibus. Cauda longior, veris apertis fides magis variegata, ut denuo erogo-cilium.

Habitat in America.

CCXXXVI. *Geophis rex Argentina*. Sols II p. 1.

Diagn.

Macula flavo-olivacea punctata, fuscum ductum concentricum, quæ uti denuo re-
bra

hinc albae delibenter, confluentesque in
generalia singula intermiserunt, & in
virescentes perierunt. Muscula trangu-
la, hinc utrinque ad articulos pedum. Latera-
les, caudae laterales; ocellis transversis
fatis, papillis longis.

Muri (Sola II, 254) corpus muscula, ut
semper ocellis introducti colorum diversitate
variegata sunt.

Flottat in Zeylone, Madagascar, Java.

CXXXVII. *Coelocentrus niger*. Sola I 53 a.

DIAGN.

Muscula oblonga sagittata, ex linea nigri-
cioribus, concentricis, formam dactyli
eminentibus; sagitta inflexa, ex linea
albescens, in medio de reliquis; lateribus
muscula similibus, et rotundioribus,
& punctis nigra circumvallata. Cauda
obtusius; sed papillam denticulata. Vix
vestigia.

In latis in America.

Incolae omnes, praesertim neri, hunc in-
speciem respectu loquuntur.

CXXXVIII. *Coelocentrus diversus*. Sola
II 100. a.

DIAGN.

Cauda, inflexa; sagitta squarosa
punctis nigra; muscula nigra irregularibus,
atque

R E P T I L I U M. 109

irregularibus, transversalibus, in medio
cauda confluentibus.

*Habitat in Mexico & Peruv; findulae non
concretae solidae, quae facile p. a
cauda ducuntur deorsum, quibus de r. h. a
lucantur deorsum; nuda caput h. a
juxta alvum, parva & deinde h. a
quales superio. a.*

CXXXIX. *Constrictor ophiolus.*

Duges.

F. 100.

Habitation in Africa ad de Gort.

G E N U S XXXV.

L A T I C A U D A *

*Cauda compressa anope similis laticauda,
non attenuata, utrinque tridactyla.*

CXL. *Laticauda tridactyla. B. G. M. P. T. T.
XVI fig. 1.*

Duges.

Cauda obata, h. a. rotundata.

Habitation in Africa.

CXLI

110 TABULA REPTILIORUM.

ŒCULA Latitudo intricata


Etas.

Cum's acuta lanceolata.

Habitat Sarinam; hyemalis in Myſia re-
gio Sarina.



HISTO



HISTORIA REPTILIIUM

AUSTRIACORUM,

CONTINENS

SINGULÆ SPECIES DIFFERENTIÆ,

DESCRIPTIOHEM.

ET

INSTITUTA CIRCA VENENÆ

EXPERIMENTA.

RUFUS VIRIDIS

Tafel I. Fig. 1.

DESIGN.

*Macula virides confluentes: verrucis macu-
larum concoloribus, irregularibus rubris,
intermedia bicoloribus.*

DESCRIPTIO.

*Cutis glabra squamosa, et fando brevis et
lucida, supra minutam partem maculosa est.*

Ma-

Musculi videntur, subpreffatis, in umbra linei nigri caute, necnonquam discreti, sed pallide confluentes, videri sicuti leuam in mappa geographicæ indicatorem exhibent. Verrucae totum corpus (excepto extimo ore & extremitatibus pedum) obducunt; in lateribus graduales & confusiores; in rostris & abdome- ni maiores, sed creberrimae sunt. Abdominales (*) communem pallido latissimam ab homi- ne colorem habent; dorsales vero, prout in muscula, vel extra illas esse sicut, aliam; & in muscula quidem communi cum videri colo- re viderisunt; et in intervallis rubent. Haec quidem verrucae inter musculum, & muscula in- terpositam intervallum, intermedia ambigi, qua parte musculum latet, viderisunt; rubet vero ex-tem, qua parte extra musculum sita possunt. In pedibus dorsum frons depressior illi ver- rucarum agmina, & qua magis ad extrema cru- rura accedunt, magis magisque in rubrum ex- celsa exasperant. Dorsis pedum palliorem tenebram vix manifesta possunt, quam tamen signa expellere exhibet. Quod non sunt & prominunt, palpebra singulorum, infra mu- scula ovata. Interius pedibus utraque interstitia videntur.

TA.

(*) Abdominales communis dixerunt, qui inter singulos- que interstitia. Verrucae haec singulae sunt haec vix pro- priam respectu partem, quoniam animal in illa anteriori parte elevata, confusum. Cuiusmodi sunt vix illi haec elevata et confusum interstitia. Singulae sunt vix haec elevata et confusum interstitia. Singulae sunt vix haec elevata et confusum interstitia. Singulae sunt vix haec elevata et confusum interstitia.

REPTILIUM 113

VARIETAS.

Unus in fœtus est: sed semper maxime magis late vultus, verrucosque palchras rubentes sunt; alii vero omnia subtilitate vitiantur colore.

HABITATIO.

Inter illius, seu cœcæ muræ obscuræ, in quibus oculis surco-locantibus a longinquo microscopice distinguuntur. Evacuatur inde nulla, ac continuo agitata virgula.

MORES.

Requirit, alternatim insulando pulvis; luto oculi fulminant electri (paula squallit) odore spargit antrochorem, caput tenet, soluta signi latentes aliquantulum reclinat, sed nulla morator, & luto capiens cubile.

EXPERIMENTUM I.

Die 16. & 17. Augusti.

Hunc basonem juveni columbar, sub alis necdum plumas habenti, valde afflicti, ut eadem malum haberet, & glaudre basonem manifeste indicaretur.

Idem sed cum juvete cane, cui necdum palchras abdomen; valde hunc basonem cui rade afflicto. Observavi enim basonem inter hac malum glaudis

114 HISTORIA

excludere, & totum late cubiculum odore suo ambrosiaco repleta.

Altera tamen die inspecta columba nihil morosius exhibuit, eam pridie valde subverti ex astrictu.

Casta vero in loco, cui basis pridie applicata est, nunc jam cubum exhibuit passiva, qui secundo jam die pure turbabant, & letis denum inter se plagis, pure sub ore proserpente, consuebant.

EXPERIMENTUM II

Die 17. Augusti.

Ut repetitis experimentis magis constaret, an hic basis columba innocuus sit, infra longitudinale valvas femori ejusdem columbae, qui pridie experimentum sustinuerat; eique distans, eandem, qui parte maxime verrucosa est, per notabile tempus applicata fuisset.

Verumtamen valvas bene nota mansit, & cito consolidata est.

EXPERIMENTUM III

Die 16. & seq. Augusti.

In primo experimento, cum basifera experimenta nos nondum satis cau-

tos reddiderant, imperitio calis fuisse, ut adituri mulieri unam in faciem & oculos quicquiderat, ut defloret; nullum vero hec uande curis vitium contexit.

Sequenti igitur die, cum jam ex prioris experimento nobis innotuisset, canes solo contactu hujus huiusmodi fieri pestulosis, acceperam pariter tales huiusmodi (habueram enim plures) quem ita obvolatum, ut sola uni protraheret papilla, quo nihil preter solam unam eam conderet; & ita finis felices, ut canis plurimum contingeretur, utique super abdomen in subiectum tabulam delideret. Cane vero manit incolore, nec apparuit posthac hejus rei vestigia.

EXPERIMENTUM IV.

Die 13. Augusti.

Acceperam novos tales huiusmodi: decreveramus autem jam ante expediri, quid fieret, si hi ab aliis reptilibus commungerentur. Alium autem copiosissimum genus, qui circa Vindobonam magno numero, & diversissima varietate speciebus reperiantur, apud nos plures ad veritatem turpissimum nostrum bestiarum: qui ex his illos spernerant eos, commiserant huiusmodi acciter, nec postea facile distingarum;

H 2

qu

qui vero cunctando assensu gravem quæ odorem perciperunt, posthac voluerunt os aperire.

Morales, qui eandem vocem extremis labiis contigerant, vox non e vellogiolanguere coeperunt, respiratione labant de laboriosa reddis, summaque, quantum ex signis conjiçi possit, anxietate nuta; post pauca vero manata convulsi perierant et ordine corpus.

Idem morbus fatalis fuit reheris, & convalescentibus; convulsi statim ab ipso morbo eripunt convalescent, illis paulo post; reliquo corpore jam mortuo viro, adhuc mirò spectaculo convullebatur eadem.

Tragediarum finem fecit septuaginta verum tamen non nisi post decem de plures morbus; symptomata eadem, quæ priorem, erant.

Ita reliquam fedius acervam cadaverum: omnes ex viscido humore foedam, pedes posterosum extensi, rigidi inventi sunt.

EXPERIMENTUM F.

Eodem Die.

Ultimo etiam stacci paro hanc eandem basonem cituli, qui statim evulsi-
me

ne acuto suo rostro verrucas ipsas impetere cepit. Singulo istu reficiantur huc, & quaquaversum particulam albam, preter quam etiam ipse quodque deglutire videbatur: non facile pepercit, aut dissilire basonem. Post experimentum tamen huc nullum visibile vulnus habuit; neque parum ipse exte de lesa esse videbatur, sed antea sibi supervixerat.

EXPERIMENTUM FL

De eodem.

Succos ita, ac plurimo glutine equaliter basonem parum lassi, parum aequo coarctatus, & per unam alteramve horum reliquias. Lac, cuiusmodi baso erat, sed ac cum in os infundebatur: antea nulla sequens sensibili mutatione, quin alacres inter se lesent, & manducant, ut ante solebant. Aqua vero ipsa, in qua baso aliquandis detinebatur, cum eam offerretur, ille quidem tantillum pergaturus, verum cito & cum horrore ac tremore totum corpus assagit. Adeoque cum in os infusa est: quo facto, primo maxime anxietas signa edens, paulo post venat, ac si emulsum simpliciter. Columba tamen eandem aquam in ingluvie conservavit, neque revomuit, nec alio modo inde lesa fuit.

H 3

EX

EXPERIMENTUM VII

Die 13. Septembris.

Conservavimus adhuc semper balanos nostras, qui omni inclusi poena aqua & polygono articulati egregie sapienturidebantur. Jussu jam majorem illorum in frusta diducendi, ut partem eam ingrederetur; ceteri autem adipe itungi ad deplendos cunes, ut eo lubentius degluterent. Qui tantillum adipis deglutererent, statim malebant, & confuso vomitabant, nec poterant amplius adgi, ut vel minorem degluterent: adeoque experimentum pro hac vice non successerat ad VSA.

EXPERIMENTUM VIII

Die 6. Octobris.

Novi mihi apportabantur balanes: eorum itaque statim unam partem, ac per domesticos meos famulicos eam vi ingeri jussi: ille autem e vestigio revomitabat, quod ei ingestum est, & longo post tempore non cessare vomere: reddebat ita spumam, siccum gastricum, & tantum pituitum, longa fissa ex ore pendens, cum incredulitate de daturno thorace & abdomine convulso.

lesibus, & evidenti quâ totius corporis contractions, quâ claudis actus bifoscos faciemus sanguinem deplaverunt, & aliquas illa anales in ventriculo conservaverunt.

COROLLARIUM.

Ex his experimentis videtur posse concludi

I. Antimonium hepae balneis calidioribus, acerbisque mucosum; quibus vero externe rubefacientia vel elixiratores infus, utitur per anapica rila.

II. Hinc tamen antimonium lacte solvendi, & curari.

III. Verum tamen venarum diu hauri posse, cum sepe etiam ex aliis venaribus, præcipue nartabola, acromosis accidunt; ut sepe vero convulsionum spectacula a tabaco in se infuso delectari solent.

IV. Eile tamen genus hepam hepideri quâ hepam acromosarum.

BUFO CALAMITA

(per Nijeling) Rept. Rat. Tib. XXIV.

Quart.

Dorsum coloris olivacei, postula ferebunda sicuti concolor ordine digitis, nuda hæc ferebunda ferebunda; latera terna (*) concolori hauri, ex rubro ferebunda.

II 4

DE-

(*) Hæc tamen longi ferebunda alpe, non hæc tamen quâ vna ferebunda hæc tamen, tamen.

DESCRPTIO

Corpori contractilis, in dorso colata est
 elongata, varia tunc emersitibus salisque
 papulis, continas tamen ordine digestis va-
 riam. Medium dorsum lutea sulphurea colata
 dividit, ab anteano ore incipit. Ab oculo
 ad crura posteriora linea transita lutescens
 lutea ex rubro flavescens viris undulata al-
 que denticulata extenditur, que ignota ver-
 tis magis litata aliquot angulis rubente
 luteoque papulis, nullum ordinem servatibus,
 obliqua est. Sub hac utraque varia cernitur
 macula, olivæ ad albam, virentes, que inter
 varias oblongas præpedando, rantes & ma-
 gnetibus decedunt, ac fœcibus magis, magis-
 que dilata evadunt. Infima denique oblonga
 ex luteo cinerea in olivæ parvulis variegata
 colata. Hæc omnia rantes pallide rubelle obli-
 que papulis. Aquilam vero ora versus alia
 rantes majores consistuntur papulis, luteis
 cineris colata, ex rubro conservata, et co-
 herente videtur. Oculi hinc minus rubent,
 que patet circa papillas pallent, atque ex
 luteo viridi in cinerium vergunt. Papilla
 sola innata continetur in rumbone cinerea.
 Præterea quatuor crura ad extremum alique
 articulum color idem sive est, qui oblonga-
 tas; sed variat eundem plurimæ fœvæ di-
 versum colore tunc nobile, transversis pa-
 llis, diversis formis ac magnetibus, quales
 circa ea quoque apparent. Extremi digitorum
 apertæ in alia sola sunt, in alia signi sive,
 quo-

quorum tunc carum habent dentem ad
 frustandum propterea. In antica posteriora
 cruribus additi in ipis vultu duo ungues spi-
 cilli, qui vultu ossa sunt, per ligamenta reliqua
 passis. Postici pedes membrana alia, quibus
 latentes esse pro instatione instructi, penitus
 erant. Certe peractissimi tempore ex pulchro
 mare utrumqueque expositum nova duna aperta
 ac nigra erat, in eam florem dano, ut florum
 hic comprehendere facti vultu sensum.

HABITATIO

De die in vultu latens, in rima terre,
 in crevis murorum, ac foraminibus, quibus dum
 videt, murum perpendicularem ultra trinit
 pedum altitudinem rorant descendere, &
 tum suspendit, nec haec in tali manu hanc
 dependebat.

MORES

Murum latet cum, ad filios utroque
 possit; amens inane trinit quatuor pedum
 altitudo quilibet. Cum exagitat, hancem
 per cutem dimittit, cum favore pulchrum py-
 rum accensum relinquit, sed gravitatem, &
 intolerabilem; quod nunquam licet, nisi con-
 tinu alveolatum. Cunctis celebrat Julio mensis,
 exalta per luto strato xano; quam in omni,
 qui cum ager statem, se congregat ad ipas
 pulchrum unicolor, & unicolor circumdatus,
 multoque cum clamore, qui luto & singula-
 ris est, unicolor luto indulgent; nec quidem
 inter hanc quam vultu latet, in luto, ut

Secum ad os usque reliquam pertinet, nec globum efficit. Item in tota semina circa thesaurum comprehendit, et palmas pedes admovent.

NIL A dicendi non decorati, quem ob rem vegetatum videri notavit diligencillime Rousellus pag. 113.

B U F O F U S C U S.

Raj. XVII. XV.

DIAGN.

Cutis lavis; maculae fuscæ confectionibus nigro-lutescentis, distinctis maximis, media linea divisa; intervalla albicantibus, macula confusa, et in lateribus & prope utrumque articulum eleganter ornata.

D E S C R I P T I O.

Cutis hinc lavis, nec verrucosa, maculae fuscæ utriusque obliquo est, quæ irregulariter inter se confusa. Harum lutescentia & lutescentes in dorso sunt, quæ media per dorsum distinctior linea divisa. Lateralis pallidiora sunt, & magnitudine decrescent. Hinc hinc dorsum fuscum est confusa nigrescentibus setulis, quæ proximæ minores habent circumscriptas; marginem quoque hinc hinc lutescentia colore occupat, & per medium plurima minora lutescentia, contra vero distinctior macula, rarius sparsa, habet, quæ inferiorem quasi epidermide dicitur. Similes & intervalla confusam occupant marginem, & hinc inde albugines maculas inter-

REPTILIIUM. 135

Species habent, quæ in lateribus, & prope articulos articulos singulos labende narrantur sunt. Oculi postice sunt. Pupilla, dum contrahitur, non transversam, sed perpendicularem nuntiat. Pedes posticos dupli-
tata sua fere longitudine, jurgatur; plures vero ceteros usque spatio ceteros dantes as-
sumunt, quo valentur inter ceteros ut.

VARIETATES

Numeri fere divergentes sunt: nisi ab-
dones maculæ, alba divergentes. Fere
ceteros, ceteros lateribus nuntiat ve-
rum.

HABITATIO.

In paludibus, maxime hospitantur in co-
nstituta.

VICTUS

Et inedia, veribus.

MORES

Intra latorem spargit, quasi alii ceteris,
lucrymæ etiam ex oculis elocentem, aliquid
sola fere de pulvere pyro accensæ perlatu-
porem. Maxime quando parum postice habet;
fere fere gemit. Copulantes parum viret;
non postibus nuntiat fere fere ceteros
prope pedes posticos contrahit, & fortiter
per nuntiat ceteros nuntiat. Ita fere ad leges
itaque aqua ceteros, qui alii anni temporibus
vix, ut ne vix in videndum præbent; sed
ceteros

etiam hac viâ capite tantum oculorum itaque
anato, &c. si corruptum vel e longinquo
compertum, fâcto se subducunt. Sic efflu-
tur, ut fœtus tandem per vias expellet in
longa humanâ compactione glaci, ovula
omnino, postea pascit, pellendo utero,
placentaque nigra grana repleto, quod aqua
solendo dico longitudine pedis. Mox, dum
fœtum hac molli viâ, appella pedibus
pedica ante comprehendit, lenius anit,
quâ eliditur, quâ impedire conatur,
ut quâ lenius elaborat an, quod non sit
compertum sit pascit; quod se post longu-
los ejulatus non expedire fecit, nec anis
concurritur sperna dimittit. Quia pedibus
rondem evolutis; phryophaçi brachiis in-
frustrat, quâ rondoâ sperna inquant fœ-
tus, quâ aqua an hanc dimittit.

Cicero hoc respicit, utro videri fâcto
videtur Bonetio pag 113.

Hac experimenta notandi tanto magis
vixit necessitas, quo magis jam Actus qui
procurantur videntur: ut fâcto, inquit,
manipulo fâcto, & fâcto inquit fâcto
fâcto. Raro quidem manipulo fâcto,
utro manipulo fâcto utroque videntur
manipulo, alio, ut manipulo videntur man-
ipulo, ut, qui prope fâcto, hâct. Ceterum,
quâ de via fâcto fâcto, ut videri videntur,
& fâcto, ut videri videntur. Adit

V.

Vir ceteris viridillimus. Caudæque Gutturæque, vel hæc suspensæ in natura, quæ paret fœpæ habet, quibus ipse hinc utrimque fœus effluat, de pili pap. Est autem de hoc speciei lemmone, præter rationem attendant hæc verba: *est autem color rufus fœus, colore fœus, rufus lemmone, et magis rufus rufus.* Appellandum ergo ad naturam ipsam, cum color fides veterum suspensa sit.

BUFO VULGARIS.

Iris. Reg. Tab. XX. sed nomen non coloris verum.

DIAGN.

Cæcis. plumbis, terpsis, tuberculis tubulis emulgentibus; fœus repensam tamen utrimque prominentia nulla ventralis.

DESCRIP TIO.

Corpus totum infatum, turgens, æquale, verrucosum. Verrucæ in dorso maxime, nec non in fœis: in lateribus delibescendo fœus caputellæ de numero decrescit. Papillæ utique rufæ loricatæ rufæ utrimque, quo oculum protuberant. At evidenter est prominens oblongo-rectangula, rufis, fœis pertula, quæ post singulum oculum fœus utrimque repensam utrimque emulget. Oculi autem pulcherrimo rufis colat, quibus caput exhibet cum ore fœis. His hæc dicitur tempore ad hancentem dicitur est. Pedes

pollicis interioris extremitatem quicquidigitat; palma vero interiorum duplo totius latitudine larva, quasi rudimenta digitorum, quibus videntur pro ciliis uti. In vasis vero pedibus, digitis interioribus veli, exterioribus tubercula. Color pro anni tempore, pro aetate variabilis, atque circumstantiis multum variare videtur: veris tempore, cum e caenis, in quibus hibernis, proleunt, hibernis laet, ac fulvis; postea vero, cum ciliis macis infus fuerit iterumque exiit, nunc alvus ignis vivit, nunc nigrescent, nunc ex rubro vel flavo fulscent.

Nonnullae noctuae exhibent, plures, praedictas; majores, minores, nigrae, aquae ac et fulvae rubentes, nullo ordine. Haec vero colligebat et plurimum ex rubro fulva fuit. In vasis tamen, quae sunt extrema in vasis collectas ante oculos habes, superficies superior plumbae, ventralis nigrae, transversaeque ordine custodiis ciliis; inferior subdant cum maculis oblietillae clarea est: vasa caenae ad hunc aliquantum coarsuta videntur, & rubra fuit; in dorso lineae subrotundae; ac subrotundae ciliis aqualescentes. Praeterea etiam nec macula in fac, neque vasa quicquidque conspiciat color. Antra etiam ciliis vasa detentis, et in mentem hinc tubercula, antennis gestante, inclinato detentis, & ideo adhaerent clausis in hunc apertor Rosentant a Rosentant. Et postea alius pro devota sua dictionem: nati semper gloriatur magis

maxis adolor conuenit est, quod idem sensus plerumque fatens bene dolores macule d'insignitur habetur. Nam insuper per illi notum apert (dicit sensus tempore afflicti quantum) pollicis de primo digito (in hac vero parte maxime tenenda) congruatur circa illa alpera. Primo tunc vest, alioquinque finitiam, apert apert, siue in carmine sit, obuius habet, etiam a pollicis parte nota thymata amplexatur, quibus sub trahit finitiam introgressa. Ita pectus proximis potest apert sensus inter hac corp. finitiam illam, utroque palodum oblatum edente; finitiam, quicquid. Cum eo per ventum est, ut partem hac notatur, nam ea tendit corpus finitiam, et una signa uno finitiam congruatur; finitiam de pedes amodo nota ita apert, ut si finitiam de videtur finitiam uno alio protrahere, quod tamen maxime finitiam, sed in finitiam in finitiam congruatur, quo ea finitiam possit protrahere finitiam, alioquinque protrahere, protrahere. Aliquando apert de finitiam congruatur; tunc duplex finitiam finitiam, ex finitiam congruatur, in quatuor finitiam alioquinque finitiam finitiam congruatur oculo ponatur, ex uno finitiam pectus congruatur. Retinet post hac notum finitiam finitiam finitiam, donec finitiam congruatur finitiam congruatur, ut finitiam finitiam. Cynus nota nota pharyngis, finitiam appendicula finitiam finitiam cum prius pedes congruatur congruatur.

HABITATIO.

In umbra, sepius humidis, hortarum undulans, ubi satis obliquo non raro terrificat; saepe in cellis vicinis per fenestras delit, subterranea hacunda maxime quiescit. Vix ac media estate et pluviosa in pavidum occurrit, hybernatio in horta.

NR. Romanorum plura uno mane trochant, movit, examinavit, aeris tactu ope inquam hyemalis infudit, succo lacteo, ut tabellae capite promissae, minus libi conturbavit, nullo equam percepto iudicio.

BUFO^s OBSTETRICANS.

Inter ut descriptio nulla.

Stilo cunctis vixit.

Hist. de l'Acad. des Sciences 1742.

Vespere infuso jamper D. Descartes ambulabat in horti regio, in quo vidit cunctas hujus bufoe cum semelle suis vidit hanc peragere amplexationem longi thoracis semelle, palmas vocis ad latera infertis, nec ob brevitatem adpectus pertingentibus. Ita expectans vidit quidam ovale oblonga, solitum, thoracis membrum, sicut testis, quorum unum alium per illam vidit lacte seorsu erit, & foras vultu robusto exhibebant. Requiescentur fuisse vixit, ut semelle primum ovalem protraderent, hoc vero facto jam mari reliquit totum reliquum

pro.

pediculisque ciliis curati. Id vero animal, caetera stupida, cum ciliis destructis pericuri; jamque tempore oculorum duobus media digiti plantae deorsum appropinquat, & exopando illic ciliis trahit, & oculis manente immobili. Paulo post oculum digitis plantae trahit eandem comprehendit paulo jam inferius, nec in hoc negotio se praesens observatori possit esse notarius; & hoc capere intendit hac de illa alternatim planta non longe post seum absolvit oblitiscenda officina.

*Ex quacis hoc natu videntur curari, quatenus se sperari? Vident, an talis tamen se fiat, seu non; ut datur hoc animal am-
malis, forte in seipso tamen non deficiat
talis?*

BATO IGNEUS (Brachia).

Rept. Tab. XXX.

Diagn.

Superi terreo-olivaceus, macula nigra; in-
fra albedo maculosa, punctata macula
hinc macula.

D E S C R I P T I O.

Statura haec minor, quam omnes alie
habetur, quippe hinc Hylo vixit; neque-
tur majorem adplicatur. Corpus plantulatum,
superi terreo-nigra, oblique inspectum obli-
quellum obducitur, cum macula obliquo si-
gnificata, utraque subequiliva. Subas

non solum per omnem trunci superficiem, sed & pedum, quatuor crura, pedumque plantis degrossissimè pedis: hincsa tempe, seu multoties intermissa ex cadendo caridicant, maxime sistente circa anam; per hanc longiusculas macule degrossissimè mutatae, meliorum, seu magis parum propiuscitur comparatione inter se confluentes. Verruca posterea exiguè utrinque occupat superficiem; densitas concolores; abdominalis contra alba; obliquis & planissimè ad gressum; in ventis elatiora. Omnia haec pondum aggraves velut contritus ascriptura est, utrimque in abdome, leuocari, uno, super & infra. Pedes possit per omnem digitum longitudinem palmari facit. Papilla in colore orbiculari; eadem in apice nigro & novo spectaculo perfecte triangulari sit, utro creta limbo. At reliqua scalis solum magis quam larva est. Copulati incipiunt April & Mayo, sed parum hoc copulatio dant, nec nisi raro facit parvula. Fortas deinde mense Juno colantur, ubi post plures dies semina per vias ova haec mutatur, quae mutatur admodum uno singula, quae a semina signi observat, mutatur haec conpergit generare. Ova conpositum majora sunt, est ipsa parva minima. Cylindrica sicut coloratur, quae seminatibus cadit, multo transverse vitula multata, & membranae foetigente vitulosa, ac sicut vitulosa, differt. Differsa aliqua, quod uni dorum solummodo, aliter magis significandi, sicut videtur inter esse.

REPTILIUM 111

HABITATIO.

In paludibus nostris Donabadiis inveni
in copes: autem omnes vix iniqui: quia in
Mundis.

MORIS.

Si propter quidam accedat, nec tamen
fugienda detur occasio, proinde ad terram so-
le applicat, ut talis sit. E latore salis
factis se subducunt in aquam, ut Ranae perant.
Aquam inveniunt mare, quo circa huiusmodi. Un
vero eam integris, opificatione quasi corrup-
ta, se incurvat; O uero perant, inia sal-
let adire latro, ut inter eorum postea spemant
amrit, sponso ditione. Cuiusmodi huiusmodi,
sed etiam huiusmodi, granitum, de uero ditione si-
mili ratione producantur tamen, qui iniam huius
relicat, tamenque integrum, quam reliqua huius
dant huiusmodi, nec non huiusmodi huiusmodi
tamen edit. Sed nulla gale huiusmodi, nec gale
inter huiusmodi comparat. Proinde huiusmodi, I quod
de die in latro applicatur, II quod in pa-
nat accedat, ut alio ditione gale.

EXPERIMENTUM IX.

De aq. Angli.

In mentem nobis venit, hanc primo
aviculari exhibere, quae huiusmodi huiusmodi per-
della uero (Exp. F.) cum huiusmodi huiusmodi
fecerant; nec tamen inde huiusmodi huiusmodi.

I a

EX.

EXPERIMENTUM X.

De eodem.

⁊ Inveni columba squallens hic basan-
culus ad latus implens applicabatur, &
cum ala ibidem tunc deinde deinde, de-
rec esset mortuus. Observavi colum-
bam fuisse humore, quem hic ex postica
parte amittit solet, consumptum. Ne-
que tamen columba exinde laesa est.

EXPERIMENTUM XI.

De 19. eodem.

⁊ Integrum talem basanculum, adipe
illius, vitum cura devariandum dedi; is
vero inde non magis laesus est, quam si
aliam carnem vocasset. Servavi eundem
adhuc longo tempore in meo cubiculo, ut
posset me illico revocare: verum nec
necesse quidem.

EXPERIMENTUM XII.

De 20. eodem.

⁊ Coravi apportet novus lapis, cum
in Exper. 18. vidissem, hanc animalcula
esse veros lapides lydos omnia verenti.
Adhuc autem tres, ut hanc basanculum
demorderem: singula faciem a morte sur-
mam

REPTILUM. 113

nam viâ est pari debilitatem, & lepos-
thymiam; ea debilitas ita est austa, ut
paulo post jam pro vero mortuis habueri-
mus. Verum altera die, cum vasculum,
in quod credita cadavera conjeceram, a-
perta, cruentus sanguis, alacris, discurren-
tes invenî, namque ex his sicuti nasci
longam hyemem adhuc confervo.

COROLLARIUM.

Ergo hâc sic viâ pervicaci, quam com-
pares, in se habet patentes aliquid necesse
videtur constare.

RANA ALPINA.

Descriptio à Fg. mss.

DIAGN.

Quod ara tota.

Illustrat in deducibus Schenck. Vix
hâc rivo botanico notitibus; ut! hâc
notis nunquam descripta.

RANA CAMPANISONA.

*Ann. Götting. p. 55. descript. det. pag. 809.
t. 4. § 3.*

DIAGN.

Cantero livida, vesiculis aspersa; dorso
utroque limbo tincti longitudinali a latim-
bus distincto; abdome pallida; signa-
tus nigra.

I 3

VOX

V O X.

Borbor sonum campanarum & loricarum percipere videtur. Audita circa Vicentiam, sed ego vivam non obtinui.

R A N A M U T A.

Icon R. f. f. Tab. II. III. (Rana temporaria Linnæi).

DEGEN.

Color nullo-fuscus; macula oblonga nigra inter oculos & pedes anteriores; cuncta fusco-fusca.

D E S C R I P T I O.

Primam, quod sub conspectum cadit, est macula oblonga nigra, utrinque lateri oculos & pedes anteriores, utrinque repulsa; pedis, quæ linear, lineam emittit, quæ habeo proculculo nuda ad articulationem femoris excurrit. Color tunc est ex nullo-fuscus, ac postea latus (nervi tenues fuerat) exuret, lumbos idem, utriusque variegatus venter medium adhaerent. Talem Ranae huius in conspectu aperta sit pinnæ. Subtus albescent, & aculei proventus variegatus erudit. Cuncta tunc macula fusca fuscata sunt. Lingua emarginata, glutinosa ad mures, quibus insidetur, illequeascat. Tunc trochleari una, venter tempore, cum canope cuncta illis, nati utrinque pollex alpera tepit: cute, quæ lineas tenet, utrinque nati in variegatione excurrit femur. Tunc tempore lineas distigat primus potest, non ten-

dum certe istius posside, quatuor loci mari est;
 sed minus idoneus, quod tunc mari conger-
 tum est macula ex cinereo effluviis; locu-
 tus vero ex limbo sufficiens. Mox costam
 ostendit illis; semper tergo, brachia com-
 plectens ut frangit thoracem, ut ex latere vi
 membras in abdomine rumpi voluerit, que
 ovula continet. Ovula citra ostium tampla-
 tiora sunt, numero 1100, in multiplica-
 tione superaddit, prolesta forte non sine om-
 ni alio, in strimendum homini? Inde gyris
 phytophagi brachia respicientes elevatam
 equam; quæ tunc appendicula cornu car-
 no limbo, sed post piosos dies decidit.

HABITATIO.

Primo vero in paludibus inter lufanas,
 quæ insaluberrime sive pueris salubri delectat,
 vivit cum colubis, malis, et quæ tunc
 vehementer in alium, ac longinquum siliis. An-
 tunc, seu tempore solito iterum redit in pa-
 ludes; ac hyeme agrorum siliis delatit in li-
 mus siliis. In culis, ac limbo siliis siliis
 tempore siliis siliis siliis, dum neque
 pro cibo esse possit; macerat enim manducata
 esse Norimbergæ Rosenius pag. 16. 17.
 quæ de Vienna, venditur cum jam in limbo
 detrita caro, nequam elevatam siliis com-
 perire. Vult itaque experimenta siliis dis-
 quere, ac siliis siliis, quæ ab eis curis siliis
 siliis, culis habere possit.

EXPERIMENTUM XIII.

Die 11. Octobris.

Aquam, in qua immerse die jam defunctabant hæ ranae, cum in eas infundit curvi; verum illa ei non magis obstat, quam totienta.

EXPERIMENTUM XIV.

Die eodem.

Applicui varias species, ut hæc ranae commoverent, cum illæ alius ab omni vel vestigio venæ valde soleant affici; verum hæc vice nec species illa, nec ipsa rana commotio quodquam notabile incommodum exinde contraxit.

COROLLARIUM.

Ergo nec mæli venæ aspectus est.

RANA ESCULENTA LINNÆI.

Die Regni XIV. XIII.

Dorsum.

Viridis, maculis nigris; ore elongato; dorso linea longitudinali latera triplici impuncta.

DESCRIP TIO

Caput ore acuto elongato, supra cervice expanso; extremitas os & maxillarem margo

ex viridi subfovet. Oculi fulgentes, antroque
 circulo ornati. Corpus viride nigra consper-
 sum macula; Præterea vero viridis color
 florentissimus est post ortum, postea pal-
 lidus; in quibdam subsistens etiam evadit;
 inde subule in plebe nata, tunc citius refert
 in fulcos. Ab extrema ore extat linea latera,
 que per medium dorsum ducta, in ano, infra
 antrum transversa ducit. Sæpius, & in fan-
 bricis veluti elevata, spatium large ab ore us-
 que ad præcoram posticorum articulationem ducta,
 tenet. Læva & crura distinet, & ex viridi
 subfovea colore cillata. Præterea crura ad-
 huc macula transversa undulata, veluti im-
 perfecta fascia, ingreditur. Ab omni abdo-
 mine, macula quodamque circum, vel ma-
 xime in serena dissoluta.

HABITATIO

In fagus.

VICTUS

Quidam, qui moritur, & quibus vi-
 cenda par est; vegetali sibi igitur, & mor-
 tua animalibus non videtur, qui non mo-
 ventur; in alia corpore autem ciliata, &
 modo moritur, utat, sed, & non pla-
 cent, non moritur. Id pro fundamento est
 itaque hanc sibi, ut semper in illa par-
 tibus, pascit sibi, cum hanc appendit,
 & cæteris aptetur; in hanc sibi utat,
 sed hanc respicit in pascit.

MORBS.

Mus claudicat, ex fortiteretis, que vulgo pro verbis habetur, claudico-quack, quack, verum utraque extrudit, et infat, quibus denique curat.

COITUS.

Don coitus infat, nonge modo prius. Juno, cum quibus aperuit status amorem, non die, nocteque clamat; pelam fere alternatimque pollicem, de cute teguntur fere alper. Cum denique oris acriter, una singula videtur in compertu gestura, natta voce infatant: quack, quack.

HYLA VIRIDIS.

(*Rana arborea Linn.*) *Don. Regis*

Tab. XXIX.

DIAGN.

Super viridis, infra alba, utraque latere linea flava.

DESCRPTIO.

Super luteo viat, et subter albet tiberia. In trochile costis, abdomen, gulari, femora, ferebatur regulariter exornata. Utraque speciemque hanc fovebant, ferebatur livido-violaceo-umbra, dantur, cum prope tunc oris. Cuius obitum ducta, utraque in latere per caput, corpusque extenditur. Post femore vero ad phibitionem danti collectitur, inde collecta angulo scutellum (quam sub-
jecta

jectus color livido-violaceus explet) nitit ad sinora, & postea pedes magnos eleganter umbit. Sinus lutei, sed pallidi, per marginem superioris maxillæ decurrit, & pedes nitidos, quos circa albam circumat umbit.

COITUS.

Quarto mensis ante primo vere sex ad piliatus se conuert, & qui hucusque minus sunt, jam, electorum femellam, de nocturno conueniunt; galam inter has in magnam monitionem pluviam incitat, quo per tale totum ad vocem intendendum. Gula per hoc fit lene, & salis; hinc post coitum facile discernitur mare, qui ante femellam anas distulit. Coitus obloquitur amplexu thoracis a parte postice, sub quo pollicem in latera sub anilla fortiter infert. Post coitum mutant colorem, & subditi primo sunt, deinde subditi sepius, hincque anas vult; deinde, utiqueque postea effluunt colorem, ex ceruleo virides. Continuo postea non amplius obloquitur, sed aditum abore ex parte anastomosis, obloquitur infante pluvie multum conueniunt, infans solo a parte infans. Carere Ergo infans infans hinc condatur, hincque anas, primo vere hinc natus promicat, natusque adhuc hinc, donec sit positus libere.

Nil in manu de circumferri obloquitur esse dante possit, Roccus. pag 11, hinc experimentum non valdehinc indiget.

FRQ.

PROTEUS TRITONIUS.

Tab. II. Fig. 1.

Dracon.

Caput globulo ornato; pedibus posticis pedantibus, trunco brevi, dorso pinnis membranaceis.

DESCRPTIO.

Pollicendo-maculatus; statura perlongior. Caput nuchulatum orbiculato-transversum, antice obtusissimum, depressum; gula tumida alba. Branchia cutanea, appendiculata; supra aperturam appendiculata utraque lobis, posterioribus lateraliter villatis, seu secundo pinnatis; summo longiori, infimo vero brevissimo. Abdomen nobile, a transparente rubello princeps. Cauda compressa. Digni pedum duo articuli brevissimi. Dorsum medium membrana lata reticulari percurrit, quae a cauda, quasi incipiens principio, oritur, inde iterum hinc, in cauda hinc, circa finem qui reflectitur, versus eam rursus, dique terminatio sine terminatur.

HABITATIO.

In lago fregetiano, quae est in alpe Eddien. Extra aquam non vivit.

MORES.

Cauda alpeis parte nullatenus non raro occurrere videtur gradentium mare. Quasi sedet in fundo locum, seu signum huiusmodi.

diffinorum. Minus parte cito perirent. Al-
tem in glutine fandi potestas. Extra equum
lentissime proceduntur, manduca minora
de villa hyacinthorum colligita. Superius de
colore pifficillorum depicti habent. Aquam
oleosam faciat.

An *gyrinch* trivale *apertus*? Inquit I. ante tempus, quo apertus, semper exoritur subito, quo nec jam cadebat. II. rursus *apertus*, qui dicitur tota anno regnare *invenitur*. III. in aqua brachia strui, extra aquam eodem tempore palmasque protrahere, quod alii *gyrini* non solent. Si quis melioribus argumentis contraria ostenderit, respondebo.

EXPERIMENTUM IV

Deutsche

Talla astrucula imprimitis s. soli dede
deglutienda; uiderem columba de cari.
Natum inde vocatur, vel male habere
videbatur; quia inter hac omnia experi-
menta egregie pinguefiebant omnia.

DISCUSSION

Polonium alpinum hucus in Böcker per totum annum, libere etiam postea non aqua, his maculis relictis, habet; nec quicquam inde lesu est.

OBSERVATIO II.

Martes cito corruptus, & cum aqua in glaciæ relinquitur; hincem tunc corruptorem palam surgit: quique pennis hoc corrupto liquorem consistit, alio die in ea præfens percipit.

COROLLARIUM.

Veneri nihil libet, si cito facta corruptio videtur impellere, ne possit usque puleculum in cibum ulteri.

TRITON ALPESTRIS

Tab. II. Fig. 4.

DEGEN.

Corporis alio tuberculato; abdomen croceo- rubro lutescente.

DESCRPTIO.

Oculi nigri sunt; corpus ventrosillum, vertice rotundum alperum; in fronte latus & crassa macula, lobos nullo. Color superius utique ater; a gula vero lade in abdomen & circa alique croceo- ruber; in & quædam infusor acies, sed ea magna diversitas, & macula lobos disempta. Antennæ duri, & rubrum abdomen colore intercedunt præfata altera more, que abdomen utrique includent. Cauda concesso- lato, fore duplo, maxime in alarum acco, qui flavescit. Pinnæ depresso circumscriptioe circulari; digiti oblique frusti, amplici, plani.

HA.

REPTILIUM. 144

HABITATIO.

In Eubææ montia.

MORES.

Est tempore phrysiæ. Inta pressa, vel
mixta talia.

EXPERIMENTUM XVI

Die 16. & 17. Octobris.

Juveni columbae hoc animal ad latus
implane applicui, & inter aliam cunctis,
possunt adeo maderant cunctis, ut ani-
malculum in columbam artium suam di-
misit conjectis. Altera die columba
claudicabat; hinc verisimilitudo nata est,
quod haustus hujus bestiolæ arthritidem
faciat. Verum tamen repetito experi-
mento in aliis columbis, in gallinis, in
canis, & felis juvene haud fuit idem,
licet singula victus valde satarent, &
ita cunctis maderet haec bestiola. Sed ani-
mala neque sunt maderant, ac fuerant
mæ.

EXPERIMENTUM XVII

Die 18. Octobris.

Juveni canis vulnus in fessur incisit,
& hunc eundem scionem per quadratum
hunc cunctis applicui canis, itidemque 15.
16.

illud. Vacua vultus bene nota melle,
 & facile contribatur, uti cunem, ne
 unquam lamberet, custodiri curaverim.

EXPERIMENTUM XVII.

De eadem.

Cuius alteri hunc eandem in os vivum
 posui: inde fluxim vomuit. Verum ex-
 perimentum deceptum erat, quia vi-
 debatur fauces mechanice magis irritare
 fuisse. Itaque exactius comprobaturus,
 quid in re subisset,

EXPERIMENTUM XIX.

De eo. Octobris.

Jussit talem in duas partes dividi:
 prolixo cranium adhaerens consensu iter
 knar. Singularem portionem oculi, cum
 adipe illam, ut labentur deglutire,
 ingessit; reserbat quidem deglutire, sed
 deglutiebat tamen. Nec vomuit, sed
 bene exinde habuit.

COROLLARIUM.

Adhuc totum hoc scissum spectare,
 cum ob id magis confectus, quam vix
 vivens est.

TRITON CARNIFEX (*)

Ta. II. Fig. 3.

Diagn.

Corporis sine tuberculato; gula punctata; abdomine maculato.

DESCRIPTION.

A pectus diversis, quod minor: gula punctata nigra coarctata; abdomine nigra coarctata maculae distinctae vixit. Crura inferiora nigra rubra; superiora vero lutea tuberculata, a macula per dorsum ducta, punctantur. Dextra brachia, manus, pedes.

HABITATIO.

In pectus antea, tuberculata.

TRITON PALUSTRIS.

Ta. IV. Fig. 2.

Diagn.

Corporis glabro; gula laevi maculae distinctissimae, abdomine tuberculato; dextra, supra pectus, utraque dextra angusta; dextra brachia.

DESCRIPTION.

A pectus distinct; quod tuberculato, pectusque vixit, glabro, dextra longitudo distincta longitudo. Gula maculae in distincta.

H.

cor.

(*) Nomen a carnis corpore, ego enim carnis distincta.

rum species conferta. Abdomen posticum tuberculatum, macula in quatuor phalange disposita, haemodis distinctis, haerentibus in lineam continuam tuberculatam. Cauda apice intus obtus rotunda; spinosae, & dorsum linea distincta.

HABITATIO

In aquis Doubsibus.

TRITON CRISTATUS.

Ab. Ray. *Fisch.* anno 1729. Tit. 25. Pag. 1.
cum *Syl. descripti.* Wernerus Tit. II. Pag.
3. 3. cum *Icon. rari.* descripti pag. 65.

DIAGN.

Corpus spongioso ruguloso, macula notanda stris; pile hispida; cauda gibba, punctata; tibiae utraque septuaginta alia.

DESCRPTIO.

Corpus supra albigine macula, notanda stris; aequale, teres, verrucis mollibus histum, alperumque. Subtus crebro - verrucosum macula subrotunda, nigro - carulea, utraque elongate confluentibus rugosi, nec verrucosi; pile pilula aliquando tamen verrucosa, verrucis acuta. Genucula nuda rotunda, verrucis majoribus hispida. Eadem ab extremo ore linea prominere incipit, quae mediam per frontem excurrit; in oculis in ciliis dentatam elevatam incipit, quae inter pedes posticos latet; digitis pedum longioribus,

REPTILIU M. 147

claud, peltudoque crenti, signa cinguntur
 falcis. Cauda in aciem subintracosa, non
 ciliatius ac peltosius fit, compressa, col-
 liforma, subpellucida, fipenne magis areata,
 igne vero rectiori acie, nigracina, punctis
 atque reticulatis, medio percurrit utraq;ue
 zona alba

HABITATIO.

In paludibus patris

MORES

Velox cadaveribus; seipsum cauda de
 pulser utitur; moribunda in contorquet,
 moriet, quasi munda.

EXPERIMENTUM XX.

Die 27. Octobris.

Multos collectos servabam mures
 sepi: hos omnes admovi huc throni,
 ut eundem morderent; novum enim
 ex experimentis quoribus hoc esse cer-
 tissimum veni explorandi lapidem ly-
 dium. Acriter vero cum dentibus col-
 litit utraq;ue. Phasconem in quib-
 us erat fixa: primo namque pedibus
 articuli sequebant paralyticum; successit ite-
 ra totius corporis, atque illa tanta
 convulsione, debitas; inde fixa ad
 motum veriti sequebant; tandem per lon-

giffima folum intervalle refpirabant; ultimo omnem facultatem motus amittiebant, & placide moriebantur.

EXPERIMENTUM XII.

De eadem.

Eundem in latiffimum paulo poft cui totum ingeffi: bene cutis citanda fe habuit, & per horam in cubiculo fedit, ambulavit, mafcus cepit &c., nec potui obfervare, an poftea revomeret? *

COROLLARIUM.

Venerum ergo huius animalis nec eſt tam credula, ut aliud valeret proclamare, cum fola infolentia feptem cutis eſt.

SALAMANDRA EXIGUA.

Diagn.

Corpore feto, cute compreffibila.

DESCRIPTIONEM

Non admodum, fed ex locum Tab. III.
Fig. 4.

HABITATIO.

In villa hucata, & ad fepes feticofa, fobus hucata cum Venerum, ubi nunquam alia feticofa vifa eſt; ergo non videtur gignere eſſe abomin?

NO.

REPTILIUM 149

M O R E S.

Tantum nobiliter cedit, testando nescit
sua spera in cui se solacii velle habet.

SALAMANDRA ATRA.

(*Astracis Reichensteini*) Tab. I. Fig. 2.

Diagn.

Atra tota nuda et nuda.

D E S C R I P T I O.

Atra tota atque nuda ; maculosa depa-
nata. Pili, digitique depaoli, nec torol,
ota legenti. Oculi utique prominenti
plene oblongi. Gulae atque malle angulosa,
nec solapale, ut praeclara. Vertebrae
solapale super regulam collae laterum

H A B I T A T I O.

In alpe Föcher, ut atque velle sol-
apale nuda. Ergo ut non ut ex alpe.

M O R E S.

Quae solapale ; torol

EXPERIMENTUM XXII

De ut Oculi.

Lach primo comitatus las hostis,
utque pene solapale, ut ut ex-
ceptis tamen non in loco revivunt.

K 1

Lac

Luc insulam cui est, qui eo bene nutritus est, nec incommodum percepit.

EXPERIMENTUM XXII.

Die eodem.

Sed illud etiam hoc, quod ipsa hinc lactaria bestia per eam suam exhibet, variis diuturnis alia animalibus: pullis gallinaceis, passeribus, catulis, felibus. Catulis & passeribus etiam in ea ipsam levis lactis guttas expressimas, ac deglorie illas coepimus: nec observavimus aliam post hoc: curia sequatur esse incommodam.

EXPERIMENTUM XXV.

Die eodem.

Duos serpentes hic ipse mordente datus fuit: a morsu paulo distans daturum, quam *sq. exper. XXVIII*. Sed tandem etiam convelli quoque cum opisthototo necui fuit.

EXPERIMENTUM XXV.

Die eodem.

Sed hoc experimento iratum animal nobis scriptis hic finem in faciem &

de oculos vibrare, sine ulla tamen solita
motu.

EXPERIMENTUM XLVI

De eadem.

Ut videremus, an etiam serpentes
ex hoc lacte erigant, ita interceptam
hanc Salamandram inter manus Natri-
ci, de continuo filis colligavimus, ut
interceder ita per multas horas in ore
servare. Defuncta autem in ore magna
vix albescent lactis, ut filis, quibus collig-
gatur, distulisse exinde maderent.
Verum exempta Salamandra ex ore Na-
trici, utraque bestia sana erat.

COROLLARIUM.

Videtur ergo lacti tale est, nec intaren-
dum bonum.

SALAMANDRA MACULOSA.

Rept. de Rana in fronsis.

Diagn.

Alia, lutea macula, macula utriusque ad
oculos punctata.

DESCRPTIO.

Caput luteum convolvulicolum; oculi in
arteriam capitis parte sita; palpebrae macula
aurata obdita. Oculi utriusque macula

serratula, raris-punctata, oblongo uniforni.
 Caput sicut etiam latera distinguunt maculae,
 in eam umbra sub macula inferiori fuit. Ro-
 strum curvum, crassum & pedes uterqueque
 curvatis, latis tamen distantes, parum re-
 tardat, parum oblonge, sed raris, sunt ma-
 culis. Color totius corporis stramineus est, qui
 subus expellitur in stramineum. Cauda
 post femora, conca principio orta, sedem ma-
 gis post se tota tamen umbra, quasi articu-
 lis costata. Verrucis oblique maculae, latis-
 simae, sed dorsales, pallidiores in apicibus
 digitatis, & laterales tunc curvatae, qui pro
 calcaneo sunt. Latere latera profundius trans-
 versatibus maculata, sed nulliusque distingui-
 tur color, qui in conca parte ostendit. Qua-
 drum, & crassius in reliquis abest an-
 nulus. Pedes pedum tunc. Tubercula
 albae sedis dorsum verrucis sunt, qui medio
 postea notantur. Corpus molle, latis-
 simum, sed verrucosum.

Wunderbaum adhibet Salamandras vi-
tro, aqua replens, immittit: observans post
aliquid tempus fœdum ovale ferere, e quo
postea ducuntur oculus gyvinae monstrum. Ideo
piscem reliquit Imperator in Asia. Ultra
tamen Cui MAURITIO in *Asia Persica*
1787. BERNARD, Salamandram propter eam im-
peratorem ferre viros meminit esse. Me-
taphorice gyvinarum non incensum scilicet
reliquit Iam WUNDERBAUM in *Tib. III*
Ovis semper alipticus, quod constat con-
tin.

REPTILIUM. 153

notum, sed jam vivacem, embryonem Fig. B; gyratum vero jam ovo liberum, sed secundum pedibus instructum Fig. C exhibet; parvam denum crura nota filumandam, sed adhuc per dorsum & superiorem eandem partem membranis clavam Fig. A. representat.

HABITATIO

In subspatis, & alpiis, & aliis montibus hybernica.

MORES

Insepala innoxium, quae se inflectit, pergit; qualem constantia quiescit.

De vehementia venae filumandae omnes Veterum libri pleni sunt. Mercurialis Petrus Cyprius Placitus jam sequenda reliquit: Inter omnes membra venarum, inquit, filumanda scilicet maxime est: populus tenax representat populi, nam, si arbori irrogaverit, omnes poma inflectit tenens, & ea, qui cernit, fructu carui vi. Quae vero si rursus ab eo ligno vel solo erigat poma inopuntur (id est: si vel parvum pambolium liquens, quod filumanda pede intigit, succedatur) idem venosum est: vel si in potum cadat; quippe cum filum eius quicunque corpore parit, vel in solo suo expresso, omne inter arboris inflectit poma. Lib. xxi. Cap. vi. Macrobius in Dialect. Lib. vi. Cap. vi. haec omnia pro dicata officio recipit, & addit. Non solum, inquit, venae inflectit, & arboris inflectit filumanda, sed & in potum relata. poma, vel citius inflectit adagla, venae enim melle, operariis modo.

Ex quibus consiliiis relationibus compulsa bene actum est adagium. *non, quem se hominem morderent, ut quis scire melius, qui lapsus habet morder.* WERNERUS I. c. 90. At plane etiam in jure Romanum moxius hoc tenet, in quo lege cautum est, ut homo, qui alios trahere ceciderit, liberandus, accensum hoc dederit, poena trahatur lege Cornelia L. 9 § 8 § 8 et legem Christianam de Scuris § 4 ap. 1. et, quae etiam Cantabrigiae in Collegio etiam dicitur Part. I quæst. 10. c. 4. speciatim de totius poena apl., qui liberandum hominem libent.

Sed primis, qui legere humanum genus monuit, incomparabilis FRANKLINUS, etiam hoc liberandam attingit. *Quæstus, inquit, liberandus signavit de aere urbane. — — —* *etiam, a quo tanta pars et colligitur nullus ut doliore penam evagantia, ut priore fuerit, — — —* *per illi rationi, ut experientia præcipi se aereus Augusti Scitum Lib. I.* Prolo post CORNACUS GRIMMUS Antiquorum aereus doliore confecti, experientia hoc alterandis, liberandam quomodocumque veniam, ut totum nunquam morder. WERNERUS plane etiam nam trahitur, & antea non qui sola morder morder, sed qua sui ordine humani laceri quædam in oculis morderi fuisse, atque talia tamen dantes, quæ morder. Reperit item quædam, de qua conspectibus sui morder morderi, etiam atque morderi, et quo pater liberandus quæ morderi, etiam atque morderi.

clavibus vel ferruginem, necesse nullas dantes non producit. Qualem possit nervi sui vires sentire per fibrillatorem, quia habet non bar pilas, non capere : ut si nervi filamenta possit confiteri ut obliquatur animalium.

Ergo quidem per hactenus dicta questio de vitæ filamentis suis delictis videtur, non tamen etiam ipse experimenta capere.

EXPERIMENTUM XXVII

Die 2. Octobris.

Admoverunt hanc lateri implenti pilæ gallicæ, tam eam columbe, & cum ala ejusdem retinens corpori appressam. Animal inter hæc nullum alii lacrima confudit, ut lacrima nullam inde modo fieret. Nullam tamen inde vel pilas vel columbe vitam committent.

EXPERIMENTUM XXVIII

Die 6. Octobris.

Duo sepes marales monorderunt hanc filamentum, quæ sententia mortem, consuevit effugere, & omni modo declinare eundem : ita igitur plurimum lacrima ducit in os mordentis sepe. Primus sub ipso experimento mortuus levissimis tantum vitæ signis reliquit, aliter dantes ne-

ma pates opisthotono, & convulsione
pedum perit. Tertio statim cadere hoc
excludata in orificium est: paulo post hoc
opisthotono corripiebatur; mox spulso
in laeu contorto, ultimo eodem laeu
paralyticus factus, tandem plane perit.

EXPERIMENTUM XXIX

Die 3. Novembris.

In testa confideram integram, cui
intrusus videbatur valde nascere solo
percepto odore, horum licet non integri-
to, sed coctus deglutit, restitit totum
in ventriculo per horum integre spatum;
inter hoc nulla sanctio lesa est, cum se
die huius propperit, attamen post horum
integram sanitatem vocata reddidit, ali-
que illa mala sequela.

OBSERVATIO

Salmaster non sicut in urina desce-
dere, in huius, sed speculatur hoc ex po-
nere huius.

COROLLARIUM

Peculiaris naturae est illud hoc, quod pra-
ter ingratum huius deperit huius, quod
supra extrahit si, nec huius extrahit, quod huius
moderatum huius huius huius
Quoniam vero huius non est, non huius
illa

illis sacidote Pius, Deobondus, Nicandri, Avernas, Aulis, qui plurima commendaverant; nec magis longe habundat, quod ultimo ult-
huc PAULUS SERIATE habent (Pius III
oponi), indigne.

SEPS SERICIUS.

Taf. II. Fig. 5.

Diagn.

Collata ulnato; foris intermediis quad-
ris; cute luteo-doliceollina, tinctura, lab-
squarata, fusa.

DESCRIPTIO

Tegmen capitis postice integrum, cum ex-
tremo per folios divilam; frons superioribus
convexum, utriusque delatatum. Thorax co-
tus curvatus doliceollina, labquarata,
convexione interiorum cupitosa. Cauda de-
plo longior corpore, tenuis, utraque collina. Ca-
lor superius luteo doliceo luteo. Collatum ru-
gulosum adnatum, doliceollinum. Color col-
lata, doliceollinaque rubellus; vinctulaque pro
vario luteo doliceo; angustas respicienda. Cor-
pus glaberrimum, molle, labquaratum.
Caput ovale. Labia obtuso-emarginata, cum
angustis longis.

HABITATIO.

In frons superius dicitur aqua.

MORES

Sequenti tardior, sed major.

Ex-

REPTIL IUM 164

Experimenta cum hac specie non laque-
rentur.

SEPS ARGUS

Taf. I Fig. A

DIAGN.

Collatio adalto; brachia intermedia quadrata;
corpora quatuordecim costata.

DESCRIPTION

Statura conglan minores, si adulti? supra
longa—caput undequaque costata. Costa
medio flavi, circulo nigro cincti; dorsales ob-
soletiores, minus distincti; ad caudam vix,
sed callosa lineam efficiunt. Latérales dis-
tinctiores: in tale apert. distincta, in sex pla-
teas, quatuor latera utroque superaddit,
costata. A costis postica utroque per
quatuor species costarum majusculorum, inter
tale line costatarum, serie exposita, quae
cum cauda continuatur, se evolvit.

HABITATIO

In maria verticalibus cum sequenti.

MORES.

Mixtae, ut non mordet, quomodocum-
que irritat; licet agiles, magis tamen fa-
cile se capi possunt.

L

EX

EXPERIMENTUM XXX.

De 30. Augusti.

Quæ violentè disiecto plicam abdominis aliquas ariculae inferimus, & dentes desuper compressimus. Ariculae solae videbatur compressionem sustinisse; nec vero dentes videbantur ad interiora usque pergitisse; aris etiam inde non effliciebant.

EXPERIMENTUM XXXI.

De eadem.

Inque eadem aricula eadem disiectum, & manibus disiectis vivis carnibus applicamus. Nec inde aricula pejorabitur, quam aliquando fuisse ex solo vulnere expectandum.

COROLLARIUM.

Erge nihil vitiosum habere videtur plicam hanc hanc.

SEPTIMURALIS.

Tab. I. Fig. 4.

Dracon.

Collum adhaere; scutis intermediis quadraginta; femoribus transversis; corpore hinc inde tantis utraque ad latera thoracis locutione.

DE.

REPTILUM. 143

DESCRIPTIO

Status inter eos, quibus infans collum
 ignavum claudit, hincque abdomen qua-
 drum latus, granulosum, abdomen planum; cuti-
 pesque tunc vixit; perles oculos ma-
 gne divitibus, hincque; abscissaque sunt tota
 terra reperta. Dorsum a lateribus distinctum
 utique hincque abscissa, ab omni mep-
 to, cunctis ad hunc cuncta. Similis, sed
 abscissaque pedes utique, posteaque hincque,
 abscissaque mediam percutit utique latus. Ma-
 gna dorsum abscissa, hincque utique ma-
 gna hincque vixit est. Squamae cunctis
 hincque cunctis utique, nec vixit latus.

VARIETATES

Aliae constantes, quod aliquid abscissa-
 rum hincque; ab omni sole velut utique utique;
 utique hoc dicitur videtur diversum esse. Aliae
 inconstantes, ut abdomen, cunctaque hincque
 cuncta; abdomen hincque cunctaque cuncta.
 Puncta lateris abscissa & cuncta quasi pum-
 ra. Principium cuncta hincque utique, &
 plan hincque, quae perpetuo vixit, nec vo-
 lum cuncta utique.

HABITATIO

In montibus, ruderibus, agrestibus hincque
 hincque utique.

MORES

Aliae cum verticibus, ab cunctis hincque
 hincque, utique hincque, utique hincque hincque
 hincque. Similis, ut cuncta hincque hincque.

L. 1

EX-

EXPERIMENTUM XXXII

Die 20. & 29. Augusti.

Aviculae in sinistro abdominis latere vulnus inflictae, & sanguis hujus sepe infusus, & infusus est. Altera de avicula sana & vegeta edit, bibit, & hilarem cecit. Repetitur est hoc experimentum semel, servare in aliis animalibus; nec quidem vocat sanguis sive ex trunco, sive ex cauda desumptus.

EXPERIMENTUM XXXIII

Die 22. & 23. Augusti.

Sepem recenter mustum, & in portiones divisum, abjecto tamen capite & cauda, columbae in modum alimenti in ingluviem intrude curavi. Columba tamen portiones ingestas retineat in corpore, & ut antea, edit, bibitque, hilarem fuit, sanaque mansit. Post biduum, ut sciret illa, qui maximam veteri viam in capite & cauda latere putabat, laetitia fuisse caput cadaveris abjecti curavi, & alteri columbae pari modo intradi. At eventus erat, qui prius.

EXPERIMENTUM XXXIV.

Die 12. & 13. Augusti.

Columbas & minores arviculas, nec non sarum curavimus ab eodem commo-
dare. Adhuc si sepe per medium quadran-
tum pertractamus, nec facile avelli po-
tuit. In minoribus arviculis passim post
mortem sanguis visus est exire. At nun-
quam aliquid incommodi inde visum fuit
percepisse, quoscunque ad experimenta
vocata, animalia.

EXPERIMENTUM XXXV.

Eadem & 13. Augusti.

Curiculos, columbas, arviculas mi-
nora vulneravimus, nullaque mascula,
membranis, nervis admodum eundem,
apud omnes modo ad rem contraxim.
Adhererat & hic fibrulae neque pertra-
ctat, spontaneque continuo copiosum ex
ore vulnere exiit. Vulnera tamen fa-
cillime confecta sunt, absque ulla malo
symptomate; & animalia, etsi facia, ta-
men se post experimenta bene habebant.

C O R O L L A R I U M.

Ergo neque haec species aliquid venerat
in se habet. Cum totum in tupa Austria, pos-
sitis Vienna, maxima habetur quantitas,

ut multis propriis extrinsecis per totum esse
tenentur; cum ceterum nihil ut pars sit,
possit nec de alio compari (quod est facile,
cum in morte nihil sit periculum) & detra-
hi cum nihil periculi sit, vel cogat de-
trahere cum magis sit cibum.

SEPS TERRESTRIS.

Tab. III. Fig. 1.

DIAGN.

Colleis solita; scuta intermediis labrescen-
da; corpore luteo, strigae sine macula-
rum oblectura.

DESCRIP. T.

Sutura inter omnes, quibus solitas est
collare deo natura. Corpus brevis, truncus
longissimus, seu perles postea ab antiqua memo-
ria. Caput etiam brevis, oblongum, quatuor
sequens. Collare marginibus est colo-
re, dum scuta oblonga contra divergent,
exceptis estibus, quae jam jam resistent. La-
tera & dorsum solita sunt, in igitur omnes obliqui
solitis distat. Dorsum nullat utique brevis
macularum oblectura significatur, inquit hoc
quatuor, quae & idem a brevis separant.
Squamae cum suis solitis solis acutis, supra
virescentes, & vixit macularum oblectura sunt,
ut in perlescentia.

HABITAT.

In terra lapidosa plana.

MO.

MORE.

Fugiens filix alacris sicile. Refugium in-
ter lapides; ceterum non ledens filicemque
micitur, uti alia.

EXPERIMENTUM XXXVI.

Die 8 Augusti.

Exiguam aviculam acriter commor-
dit in pectore, diuque retinet: illa vero
valde resistit, ac sese combatit sub-
ducere. Sed paulo post respiratio avicu-
lar lebet liberrima, & moribatur
sub ipso experimento, antequam illud ad-
huc sepe e dentibus dimisset. Jussu vero
aviculam iterum exacte deprehendi: & tunc
apparuit illam esse fractam, & aviculam
tam, prout modum, adhuc externum
violatum esse passam.

EXPERIMENTUM XXXVII.

Eadem die.

Repeti ergo illico experimentum
cum alia avicula, columba, gallina, co-
na, canalis, scilicet, etiam deficiente
subinde ex valensculo sanguine; corpus
tamen haec post plurimos mortis minu-
ta vel agrotare videbantur, nullo mi-
nus mortuum ex illa usum est.

L 4

EX.

EXPERIMENTUM XXVIII.

De 9. Aprilis.

Adferri curavi recenter tales sepes: obliuissimas teterrimas aviculas; interea irritatos & in sanam ferocem aetiam sepe sponte iruebat. Sed sine nihilominus manserunt omnes aviculae, comederunt, biberunt, coxerunt omnibus diebus sequentibus.

EXPERIMENTUM XXIX.

Eodem die.

Columbe, & paris dachos vulnera infliximus; & glutis, quae sepes solent in ore habere, de industria expressimus, & strictonem credo vulnere. Constantur omnia, veluti solent, optime notae valagra.

EXPERIMENTUM XL.

De 12. Aprilis.

Columbis denique nova vulnera infliximus, & irritatos admodum sepes, qui die & periculis artibus harebat, spontem etiam manifeste ex ore iruebat vulnere. Experimentum iterum, iterumve repetitum est, neque tamen aliud a priori evenit.

COROLLARIUM

Ergo sacerdotatonia curi Sps terrena

SEPS RUBER.

Ta. III. Pg. 1.

DIAGN.

Collata solito; fatis intermediis distinctis; lateribus fatis; dorso albo distinctis.

DESCRIPTIO.

Collata, & abdomen coloris viridescens, oblique intersectis rubescens. Collatae squamae punctatae, interna bipunctata, seu characteris insignita. Squa abdominalis bipunctata, externa tri- aut quadripunctata, in characterem confusum. Latera viridescens, ut in dorso lateris; latera nigra, corporisque macula nigra, viridibus superpositis squamulis; pupilla lateris candido- viridescens, oculos imperfectos seu dimidiatos utriusque dupli serie constituentibus. Vertex albus subpunctatus; inde nucha, dorsum medium, superiorem cetera pars fuso- rufa, et line obli- qua macula. Tota cauda fuscis pallide rufa, oblique intersectis argenteo- resplendens, nigro- punctata.

EXPERIMENTUM XLI

De 15. Augusti

Avicula circa trochylum in com-
moda, ut sanguis undequaque prodiret.

L. 5

Ve-

Vesica arvicula nullum inde erysiplasin
signum dedit.

EXPERIMENTUM XLII

Die 25. Augusti.^o

Columbam, & duas arviculas curavi-
mus ab hoc quam sepius commoventi,
ut labente ex vulnere sanguis prode-
ret, & animalis sub morbo insuperantem
dolorem tolleraret. Tamen altera jam
de omni sua, & alacris erat.

EXPERIMENTUM XLIII

Die eodem.

Vulnera inflicimus columbas, ut hic
sepius mada morbo curas comprehendere-
ret. Observavimus vero sepius ex ha-
bitu quasi sanguine multo factum credulo-
rem. Sepius itaque admodum vulneribus,
cum desiderio comprehendere curas. Co-
lumba tamen quiesce sola hanc resolu-
ta est, & vulnera lacerabilia sunt consi-
derata.

EXPERIMENTUM XLIV.

Die eodem.

Cui prolixius inflicimus vulnera, ut
hervi decedarent. Applicabimus se-
pius

ples eundem sepe, quæ talitate lectus
factus nunc adhuc additatus memorie. In
vulnere cetera nihil malignè observatum
est, quàm lino citius, ac non sperantius,
curvabit.

C O R O L L A R I U M.

Ego & hic seps noster venio cuncti.

S E P S C A E R U L E S C E N S.

TIA I Plg 3.

DIAGN.

Collum solusq; totus intermediis septem-
da; corpus caeruleo-margineatum; latera
oculata, triplici utroque serie.

D E S C R I P T I O.

Collum & abdomen laevi, punctis in
medio parte alba, abdomine rufa, ad latera
utroque manifestioribus, nigra. Color dorsi,
laterisque vultusque margaritaceus. Oculi-
rum in singulis latera tres septes: una in medio
dorsæ, et imperfecti sunt squamulae dactylæ
inclusæ illæ, papillæ irregulari constituti-
tibus, alæ vero squamulae circumpollas ni-
græq; superiores & inferiores ferunt quod inter-
cedit spaci, siueque coloratus; infra latera
superioribus est. Oculi vero media dactyl
ferule longitudinalis illæ sunt, macula utro-
que rhomboidali ciliata alba-nigra signata:
hæ hæc continentur. Eos profundius fira,
oculorum laterales una, & per mediae super-

dorem partes emittat. Lateralis superior series adhaec ultra pedes posticos per quadam latus excurrit, hinc inter & sequentem phalangen profundius valdeus interjicitur color; reliquis utriusque series ante posticos pedes terminantur. Femora & cubi in externa parte nuda, seu imperfecta quippe oculis ornantur: totum tamen utrius haud deficiunt.

Nulla cum hac specie saltem experimenta.

SEPS VARIUS.

Ta. III. Pg. 2.

Diagn.

Collata luteo rufa; lineis intermedis lateralis; corpore viridi, punctis luteis variegato.

DESCRPTIO.

Vertex oblique viridis; latera capitis, & regio, quae retro aures est, ex luteo subrubello & alio subello subalbicante colore variegata, & argenti habent fulgorem. Collatum marginatum, dextra aspectum cavalebat, oblique rubellum, argenteoque inter fulgore. Abdomen flavum atque punctis, latera infimo & latera contiguo loco flavo-viridi, punctis singulibus, superius ex dilute viridi & luteo variegata. Dorsum obscure, in cauda tincta, & latera superius argenteo viridi, macula nigro-lutea hic praecursoribus. Series macularum abscissas fulgorem nunc, utrumque utriusque dorsum includit. Inferior.

2199

REPTIL IUM. 175

anims evidens, per latera variegata ab aure ad pedes posticos extendit; superius ad quendam contractum. Retro hinc reliqua adigunt maculae n. Dorsum postum parum, caudae superius, & pedes postici laevi. Cauda vero subtus albescit.

HABITATIO.

In reptilibus vivit: rari in montibus circa Vercor.

MORES.

Dum crevitas possit, liliis, tachilinis; sine videretur in pedes, maxillis laevis, molculis.

EXPERIMENTUM XLV.

Die 19. Augusti.

Probesit arviculam circa jugulum, nec solam volaverit, sed contracta laevissimam per se suffocavit; inde arvicula male habere visa est: sed tamen sibi celsa sponte resedat est, et altera jam die canent, & liliis elis.

EXPERIMENTUM XLVI.

Die eadem.

Colanham, ac paros dunt, quorum alter ex aliquo priorum experimentorum adhuc laevissimam erat, videretur in laevissimam
com

concorda: videmus singula ex parvis
vulnerecula, quæ dentes relinquebant,
esse sanguinem. Atrox nullam horum
intexit, etiam quidem pari per hunc ali-
quot percipio dolore videbatur con-
tribari.

EXPERIMENTUM XLVII

Die 10. Augusti.

Columbam prioris experimenti ita
convulsit, ut oculum detraheret, ut-
que hinc ferocius plaga randa superesset.
Verum valens crosta indurata succubaret,
& post paucos dies sub ea nova crusta
cicatrix est.

EXPERIMENTUM XLVIII

Die eadem.

Cuius ac fell ad ferarum oculum & par-
ticulam adiposam discessit, cum sepe
hanc admove. Animalia restabantur, &
signa doloris edebant: sepe iterum hanc
spumam vulnere intextebat. Attingit a
morsu nihil videbatur præter brevem
dolorum, esse passum, & valens citius
clausum hunc, & intra breve tempus
uniquæ constantem est.

REPTILIU M. 173

COROLLARIUM.

Ergo & Sepa veritas extra omnem vanaſ
ſuſpicionem ſufficienter poſuit eſſe

SEPS VIRIDIS.

Arctophis Fieringhi.

See Sepa May II Tab. CIII. Fig 4

Descri.

Collare ſolito cinctus, ſcuta intermedia
ſubrotunda; corpore elegantius viridi.

DESCRIPTION.

Indifferentes maxime, grimalis teſtus,
quatuor totum viridis circa peragrat colada mi-
detur; hoc in ſole omnibus ſmaragdis, chry-
ſidis, & beryllis eleganter. Nucha tamen
& medium doſtes, & cauda ſubtus ſepa
nigra punctis parvis variegata. Collarium
cinctum eſt: ſquamis vero ſolito margine
affertur. Abdomen, vero ſupra viridibus,
cauda ſicut ſcuta macula ſubrotunda ambi-
turus ſubſcripta. Caput ſepa ſolatum
eſt, in ſole auro-rubens ac ſplendens, oculi
ſiſtentes viridi oration: pupila ſupra ſua
aurea cauda nigra.

HABITATIO.

In aggeribus hydrotis, ſubrotis. in paſſis
fructibus ſpica. In mari & montibus. Aſy-
ria ſupra ſubrotis.

MORBI.

Intrepida spectatur in sole, letum colla utrinque alternatim tollit, ut frangulum merito appellaverit Sana. Vix fugatur strepitus, nisi huius communi accedente sui robore quod con-ferunt: sapendo strepitum non edic, nisi volu-ntem legum maculam.

EXPERIMENTUM XLIX.

Die 30. Augusti.

Hic columbam in articulo dextro fe-moris tanto morbo prebendit, ut subito totam cutem illius loci avulserit. Post primam hanc mortem eodem adhuc fere loco admovimus, ut ipsa jam nudos morderet masticulos. Prebendit agram denso acerrime, nec facile dimisit. Post hanc cutis detrusa denum adhaerit, & columba post claudicationem unius diei facile convalescit.

EXPERIMENTUM L.

Die eadem.

Idem scriber momodit juvenem co-cum in abdomen adhuc ingulsi; cutis horrendo clamavit. A morbo tamen nec sanguis, nec punctura observabatur, sed plica solam, quam neque prebendit, exstibat, quomodocumque solebat; dux

REPTILIUM 177

domi plicis cunctis in aliis quocunque prolo-
muscipitur; cunctis cunctis bene valent.

COROLLARIUM

Ergo plicis violentia moris valens do-
lensque licetendo intelligens possit, quam
venenosa qualitate ledere

Homo sine moris capere possit

Cum cunctis sint, bonum, & malum
quodam perbent.

EXPERIMENTUM II

Cum sepius cunctis

His viti non dantes amplius ca-
pere quocunque sepius species, eas in
mucibus domum deportare, domi pro
foco mactare trahere, dantes in cu-
biculis &c.

OBSERVATIO DE SEPIBUS IN GENERE.

I Sepes plicis, quae mactantur sibi
dantes mactantur plicibus sicut sint,
II plicis cunctis sicut sint cunctis cun-
tis sicut sint, ut plicibus plicibus, mactis
mactis respondet.

Ergo sepius plicis nec sicut sint, nec
mactantur plicibus; quocunque huc-
usque mactis viti sint species; nec mactis,
nec mactantur plicibus.

M

AN

ANGUIS FRAGILIS.

Tab. V. Fig. 1.

DIAGN.

Corporis filicapsuli; glaberrima, nitens,
aureo fulva; macula frontis, cervicisque,
ex quibus duas lineas filicapsulas longi-
tudinales.

DESCRPTIO.

Squamis in ceteris in medio stris
pluribus, per margines vero magis apertis
ciliis constitutis: phalangibus longitudinalibus
sex; in cauda decem, quatuor; squamis
longitudinalibus duabus, de vix se ne vix
stans, ita sunt hinc appressae, ut diffi-
citer numerentur. Ore aculeo cinctis: maxilla
inferior integra, fortis, quibus squamis, et
Corpus totum effulgentissimum, splendens, squa-
mis appressis indurabilibus. Supra aureo
fulva. Ad latera fulva decem ex fulva ar-
genter. Supra adhuc lineae: subobtusius
duabus fulva linea per medium dorsum a ma-
cula longitudinali frontis, alteraque cervicis
incipit, ubi sunt confusa, recta. Similis
punctura lateralis utraque ab oculo per totam
linea incipit, in cauda grandifera. Sub es-
tra sagula squamis puncta fulva; hinc in-
tra punctura, quot sunt squamulae.
Maxilla inferior lineola distincta. Lingua
obtusius emarginata, molliori brevi. Caudae
postica medietas squamis actius appressis
distinctissimis; anterior, magis pallida, rep-
dit:

dic: ut crederet, hanc cuncta partem, cuncta
atque, cunctas, quod in seipsum frequens.

HABITATIO.

In passis, in mactis, etiam ad vias,
et in mactis.

MORES.

Tassa, ut aliquos hinc, riget hinc
sunt; hinc qui trahere vellet, rumpet.
Hinc sola oculis fragilis! an sola ut rumpi
pater? una specie rupta non est.

EXPERIMENTUM LI.

Die 4. Octobris.

Haec mordere non solent, quomodo
cunctas hinc, sed magis cunctas riget,
et mordere posse, dum hinc de in-
segna, hinc seipsum, utrumque ha-
bent maxillam, non sic dubium. Itaque
instrumento cu diducere debemus, de
pium oculis alioque cunctis mactare. Ad-
huc ita ducimus, hinc hinc, compen-
hendens eam piam; oculis tamen, alia
quidam quidam, hac vice non ej ducit;
videmus oculum in eo esse, quod ducit
cunctis brevis hinc: de oculum non possit
penetrare. Animal etiam posthac oculum
hinc percepit inconvictum.

Ma EX.

EXPERIMENTUM LIII.

Die eadem.

Hæc omnes aviculas experimento adhibuimus, quæ, etiam vulnera, tamen inde plura non videbantur agnoscere.

EXPERIMENTUM LIV.

Die eadem.

Incidimus ergo columba cutem, ut ipsa rivas carnes densissimas prehenderet. Adhuc sic munera longo tempore angui, & hominem, quem in ore habebat, vulnere laussit. Columba vero ex vulnere restituta est, & sana vixit.

COROLLARIUM.

Ergo innocuissima, hoc hædus venenissima species pectore insana.

NATRIX VULGARIS.

Dixit.

Ex caute considerante agnoscit ad occiput utriusque; macula albo-lutea, quæ a nigra excipitur; macula in sacro inter pedes cum opposita confluit; trita abdominibus sagulis utriusque macula squamulosa.

DE-

REPTIL IUM. 151

DESCRIP TIO.

Caput depresso-planum triangulare, atrum, sed fides superioribus ad oculum usque albis; ut linguæ squamæ in marginibus nigra. Genua atr. Maxilla inferior antice depresso, & albas nervi firma est, ad præcedens, hinc ad maxillam inserta. Gula & labium inferius alba: inde terti præcepso atrum sunt macula fides, ut supra huius coloris, retro caput utriusque latus commissuram maxillarum tra. Retro singulare alba atr, atrum, que albas per tota, ut oculorum præcedens speciem facit, antice, ad oculum inter se continentes, ac albas desuperantes. Præter linguæ usque ad dextram gule albam retinet co-locum, tum macula, in medio carales, ut dicit apparet, non fides molens per lo-quentes, sed eleganti irregularitate jam atrum super, jam albus, nullo depresso vel con-tractu ordine. Ad istam et macula jam inter-venit labium incipit foveam occupare, & ita per reliquas; molens tamen in singula la-tere, sed fides extremitate utriusque reliquas fides, alba quæ & apud linguam man-til, que magnitudine macula inter se con-tingit variat, & ita ad atrum usque continetur. Crura vero squamæ irregulari macula fides. Gula superior squamæ sub-posita atr; squamæ vero carales fides, hinc in fide subventilantes, maxime cum atrum paulo ante postat carales. Maxillarum etiam, sed obliquo, quæque fides fides

qua per dorsum medium, dum in fupremo latere, ac squamularum margines tenet, & tunc lat. Series, quæ medium dorsum percurrit, jam ante unam regionem evanescit; laterales in teretes in una solentur; squamulae vero per eandem aliam occurrunt. Squamulae præterea singulae sunt longitudinalem medium emittunt, quæ tamen in cauda non continetur; observari. Sunt adhuc dacti squamulae scopæ; laterales rotundiores.

VARIETATES.

Tantum sexus valetutis hinc efficitur. Mares (quam crebrius) labiorum fovea, fovea & squamula sternum, ita & oculi, quibus & circulo circumscripta capitur. Corpora cæterum ciliolare nigricans, nitens; maculae ad caput latera latera. Fovea & fovea, & oculi dilate carales, dorsum cæterum, macula capitis alba. Cuius plerumque regio foveas squamulae, quam mar.

HABITATIO.

Piscis in demersis, sepibus, frutibus, vallis, pratis, & quæ adhibet.

MORES.

Ab injuriis non irascitur, sed magis timet, & fugam facit. Inter hec sibi, latorem formi alacris ambrosiam, quod patitur, hinc sperat, ut a longinquo jam solentur. Locum in quo habitat, eandem tenet in-

EX-

EXPERIMENTUM LV.

De 6 & 16. Augusti.

Hic serpens eundem modo in iter excitatus, ad spontaneum tamen motum dilato casu stimulari non poterat; hinc distulit emiculae sunt, & plex abdominalis eidem efferta & intercepta. Compressione externa dentes, quos habet acutissimos, ut adigebatur, ut eum vehementer exileret. Ab experimento volensula perocqua, huncore salivae serpentis perfusa, spererant. Idem cum colubae experimentum indicabatur, & videtur toto tempore, quo adiacis fidei dentibus adhereret, eum, virgulam illam, in qua hic amantibus lingua haret, identidem ad novam partem democle, ac retrocursu iterum. Idem cum manibus arduis illustri experimentum est. Accepit vero adultiorum Nancem, quae videtur sponte ea deducebat, & salivam succellis spem faciebat: verum cum hanc spem manilla nec cohereret, nec recte articuletur, non potuit sponte monderet; hinc eadem admanilla adhibetur, quae in praecedentibus experimentis. Amantibus omnia salva, sana, & pouda manerant.

Sparsis subtilem univertam conficitur ; reliquam caput obscure typum est. Medium ventrem obscure costis notat. Inferior ca-
pillis anteriori parte delapsis ; superior dis-
persis utraque est. In media dum gradiorum,
submarginibus, subdentata, sibi e regione
utraque oppositis fatis, ac in fovea utraque
colorum virgules maculae sunt, quae autem
super fovea capitis obliquis, sedem videntur
constituere. Inde latus, sed minus, & al-
ternat. Utrique indentata per dorsi medium
utque ad finem caudae, intervalla sine dorum
sparsorum interposita, continuant. Reli-
qua corporis color citius subtilissimus, leges
saturata minus, ad latera & vix ex parte
subtilior. In lateribus obliquis, parve haec
inde etiam maculae sunt. Nares scitorum,
sparsorumque continuat cum Graecorum
satis, si minus est. Scuta & sparsum mi-
dillium, uterque sparsis subtilissimis, subdipha-
ra, et caruleo reflexis. Dorsum fovea al-
bicans, & costam certa marginem reflexant ;
den alios color ab ipso & frequentibus, sen-
sibus reflexis cedit, qui latera diffusior ;
utrumque parte utrumque plus de caruleo cha-
lybeo participat. Alios tamen color ex non
paulo defert, sed ad latera utraque in sin-
gulo fovea exigitur, quae & vixis caudam
continuo minus est, maculam utraque. Sub-
inde, utque nulla certa lege, utrum si media
frequentior, seu paulo albaque antequam
paulo. Cauda sparsum utraque ad latera
habet, & sine pandit, utraque vix

hæc maculae nunciantur, & in universum colorem denso confusantur magis pallidum, quam sicut supra autem erat.

HABITATIO.

Circa Vireonem hæc res: in villa, folia, & per bar. tunda.

MORES.

In moribus prioribus sequenti, tunc dupli-
citer superius macula; tunciora cum macula
macula in superius dupli-
citer quod lantior, maculæ
dentibus utitur, ut sicut vix
ediphet, libere etiam magno cum libere,
ut dicitur per instrumenta utitur et
cum dentibus extrahere debet. Traditio
tamen maculæ, tunc maculæ homin;
gratior, quod sicut & sicut opert.

Si juvenis vixit ablatum; cunctis
maculæ, tunc magis obliquo.

EXPERIMENTUM LVII.

Die 14. Augusti.

Primo ad experimenta adhibuitur
juvenem cuonem, quem inclamenter no-
morde in abdomen: inter hæc cognatio
irritavit virgula serpentem, ut magis
magisque inclametur. Debitum vero
dentibus per instrumenta extrahere. Post
mediam horam, cum quoniam sicut ca-
nia, denso ablatum, eundem serpen-
tem,

tem, ut, qui parte morderi vellet, ipse aligeret: monardit aurem eadem ita intra aures, ut non nisi multo labore solvi posset, & instrumentis adjuvas. Post omnes hos morfus sensus fuit eadem, ac alacer, ut ante. Jam vero de selem juvenem ad incognita ei tormenta adhibuimus: commota est in abdomine uno absterore parvo, sed vilibis, & terribil cruento vulnere. Deinde ad rabien feramur coarctatum adsteroribus feroci: dolorem morfu illato feramur infolio equata seba infabatur: sed repetito adhuc aliquoties experimento sensus & jaculus mansit eadem. Tandem de columba feram animal adsteroribus: illa infababili sustinuit dolorem indicavit, quoniam fallerebat; sed solus dentibus, quasi nihil passa, evolavit.

EXPERIMENTUM LVIII

Die 13. Augusti.

Cum morfus super eadem illam non noceret in antecedenti experimento, proinde eam super eadem diducimus eam, ac nates jam mollescentes feramur morderi: repetimus hoc sepius, etiam manifestam speciem omni vulnere itumescit
vid-

videtur. Verum cum cum paulo post
vulnus laceret, mihicuius adhuc aliud
ponere auri, alijs loco mortis evictam
ferum iterum admovent serpentem,
& sub ipso mortis ad iram extenuaverunt.
Sancta cum non magis argotavit,
quam fuisset a solis valentibus expectan-
dum; suo vulnere ipsa expectatione
effusa confusa fuit.

COROLLARIUM.

Hac mirabile docet hanc Corollam
veneris curis.

COLUBER VIPERA
ANGLORUM

Tab. IV. Fig. 1.

DIAGN.

Corporis toto aterius, immaculato; squa-
mas laceratis, carnis longitudinali incom-
pito; labas parvis albis, nigrae vinctis.

DESCRIPTIO.

Medusa dentium hinc rades, que Re-
dax est vipera. Oculi aures rubri. Labi-
rum squamulae centro pulchre oris vinctis
que reddunt. Eadem rubri circumferentia
squamula adornata est; inter has alijs ad
oculos stricte munita parietibus, que squa-
mula lacerata fuit. Orbis qui fovea, que
oblonga fuit, magis intus fovea con-
fuit.

REPTILIUM. 189

ferre, post quæ duo minora cuncta pollicem concurrunt. Subsequentes squamæ hinc velis accipit detrahunt, & in accipit sunt minutissimæ. Corpus nihil singulare habet, striditum est, squamula hinc dorsi magnæ haeculita, lateribus subrotunda, omni- bus ceteris inscripta, maxime pectus in summo dorso, hinc hinc longitudo, veluti in longitudoque superius. In crura curat bene explanatur. Subtus minutissimæ, uter color hinc pulchrum respicit in nigro-chalybeum.

HABITATIO

In silvula Schenberg.

MORES

Mors hinc per os aridior. Mors hinc hinc.

EXPERIMENTUM LIX.

Die 4. Novembris.

Commonit aviculum in deplumato utraque pectore multis moribus, cum levi etiam dissectione cutis. Avicula exinde statim male habere incepit: ille pendula erant, & planas distorta; alia die nigrescentes circa osacula vultuscula exhibuit plaga sine tumore: inter hæc tamen comedit, & bibit. Sequentibus diebus maculae sensim evanescunt: animal

serum ac hilare fuit, & exivit, ad nova
jam experimenta aptum.

EXPERIMENTUM LX.

Die eadem.

Curvitas etiam tepius morderi co-
labam in sinu deplumato: post ex-
perimentum manile quasi morsum pol-
licum supererat, qui cito evanescerebat:
nec columba exinde egrotavit.

EXPERIMENTUM LXX.

Die 4. Novembris.

Volebam etiam videre, an confecto
mordendi modo non magis inferri dam-
nam possit; hinc canem nudo suo abdo-
mine serpenti oboli: ille irritus, quemad-
modum hac species solet, apertis ore per
arcticos quasi istus irruit, idque ultra 30.
vices repetit. Post hac omnia caste ex-
aminavius curam, nullum vero vel mini-
mum signum observavius, & animal,
quod sub ipso experimento non relacta-
batur, aut dolorem intabatur, etiam po-
stea exinde non egrotabat.

EX.

EXPERIMENTUM LXII.

De eadem.

Eidem cani valvæ in femore profundam, duos transverfos digitos latam, ita, ut serpentem exacte carnes potantur moris comprehendere, infixi. Cum ergo incisus os aperiret, applicui, & digitis nullas super carnes dū compressi, ha spuma natebatur in vulnere: idem adhuc fecerat, quam decies repetitum est. Tum vulnus sicut exacte claudendum; curis vero clauderebat quidem, sed edebat & hñebat, & paulo post per multas horas dormiebat, atque intra duas septimanas in integram a suo vulnere convalescebat, quod a morbo nullam profecto malam notam contraxit.

EXPERIMENTUM LXIII.

De 3. Novembri.

Hinc experimentis innotuit mihi non solum hujus animalis venenum esse, sed viribus etiam ad nocendum destitit. Obstatum ergo absque metu unusquisque nostrum proprias manus, utram inter se ris cum his moneret, sed vi inefficaci sequitur casum perire.

CO.

COROLLARIUM.

Adhuc non timendum esse hunc serpentem popularium.

C O L U B E R B E R U S.

Tab. II. Fig. 1.

DESCR.

Corpore cinereo (sericeo), et fuscis rufis (cum); tertia dorsali nigra fulminata, utrinque punctis alternis, cujusque suis respondentibus nigra.

D E S C R I P T I O.

Descriant hinc notitia eadem, quae sequenti Rodione. Extremum os, quae lacinia testatur, aequant, sicuti illa cinctus prioris, sed minor. Caput vero pollice magis distans, in caput singulum lobum lateris nigri alius macula extenditur. Gula, ut utrinque lobum obliquo sitientis; margines vero squamularum subscissos. Sub extrema ore dissepimur majori. Caput oblongum depressa-intra-positum. Oculi lunatus ignis. Vertice notum due longitudinaliter conflant introitus. Nucha quoque videt macula oblonga, recta, subscissos hinc, pollicem longi, post quam, lacinia angula altera, in subscisso quasi cincta, per medium descendit dorsum extendente, ad caput finem extendit, & evanescit. Latus dorsum macula, multo tamen obliquo, occupat. Hic et latus macula, quae ad committitur maxillarem est, interitus obliquo.

REPTILIUM 121

Et utroque, & cum dentibus modis illis utitur alternatim. Color serpentis fulvus est; maculatus vero profundius, utroque sine mixto. Scuta abdominis laticella, ut modum propemodum peripherie pariter tegant. Pinnæ, seu palæ cortagus, oblique affixæ, cum marginibus fimbriatis; sequenti ex pallido & nigro variæ sunt. Reliquæ omnes latic nigricantes, marginibus latis duplicatis. Caudæ teres, gracilis, brevissima. Dentes omnes hinc auricula lere instructos & postroctum recurvos habent, ut pectus, quasi obstruere simul, duplicem quædam passim, effigiem vero utroqueque.

HABITATIO

In insula Schœnberg.

MORES.

Misteri illis horrendis Misteri subita
crux in insulam.

Et Muri macule aque, quæ ferunt signo-
tum.

EXPERIMENTUM LXIF.

Die 22. Septembris

Plurimum in rana concitatus forcipe
admirans (abdomine, ac fetore de-
placuit) colubæ, & tandem convul-
sus mordere, usque dum furcas unde-
quaque prodiret, & semarctos, atque
abdomen quasi infusa vasa scula horre-

N

8.2

levis effec. Diutius columba statim claudicavit, debilis vixi est, quiescit, nec locum manere sustinet, oblatus cibum, potumve recusavit. Paucis post minutis exanimatus locum demorsum, qui circa vasculum majore nigrae plagae exhibebat, quasi ab effuso sub cute sanguine. Ceterum tota sicca circumque rigebat cutis; sanguis hinc inde prominens rigebat. Altera de pars lute nigra & tumida fuit, quasi extravasat esse sub cellulosa late diffusa. Tumor vero molli, rugosus, & quasi emphysematus erat. Tertia de ulna mediam hominem vehementer convulsa, tandem mortua est. Jussu illico deplumari: tunc apparuit partem senoris gangraena foetida jam eliquantem; tumorem ad thoracem usque, & ad oppositum latus diffusum. Diffuso senore inter maculas, & sub cute erat partem congruam, partem diffusam inter erat; omnia ad ossa usque nigra erant. Denum cor ipsum tumidum, in tota substantia nigrum, friabile, sphacelatum.

EXPERIMENTUM LXV.

De eadem.

Eadem tamen die eadem, ac solem mordari vivam: ita vero animalia nihil

malade quæta fuit. Sequens itaque die-
bus omne animalium genus sive hæc co-
lubæ objecimus; mordebatur junioræ,
& pertinebat avicula ad hoc. Curiculi
quoque, quibus cura est delicatissima:
verum est hæc ad singulos fere Xmas san-
guis prodiret ex vulnibus, tamen non
poterat ultra hæc animalibus illam
inconveniam observare, verum vul-
nacula intra paucis horis jam evanes-
cebant.

EXPERIMENTUM LXI.

De eadem.

Verum, cum tantum per Mm co-
lubæ memorasset in experimento
precedenti, suspensus sum, ne forte
non ita profunde penetraverint dentes
itaque necitimus avicula, quibus deli-
catissima insuper cura est, dentes illos
filiatos vi appressi, ut profunde in carnes
intraret. Avicula tamen omnes evase-
rent, & vulnacula nullam contraxerunt
rigedinem. Item in cunctis factum est,
sed post 24 horas nihil, præter vestigia
quæ passatæ, supererat.

EXPERIMENTUM LXXII.

Die eodem.

Itaque ut morsus rade inferretur canibus, vulnera hinc ultimas carbas dantes, & uti fell: mordebant vix tanta aviditate, ac in singula haec animalia, ut humorem oris & dentium vulnem, non sine spuma facta, immitteret, cum ob dolorem servitum vehementer clamaret. Verum vulnus facile tamen, & sine mole non brevi unicuique confabulatum.

EXPERIMENTUM LXXIII.

Die 6. Octobris.

Sed etiam novum, ac rade servitū ferociores, neque hominem confutidre adhuc nigrum alpiam colubum natum sum. Ut igitur statim a directis experimentis igni inchoarem, vulneravi columbas, pillos, cuculus etiam culis detulsi, ut protinus rades moreretur molles; monerit ver o incredibili cum ira, & ferocia, & continuo sibilans; cumque caput dantes apprimere rade oculi, salivalem humorem plurimum haurit: vulnere. Vulnera tamen omnia hinc non erant, & cito confabulatum. Circuli quoniam

effem ab experimentis dimitti dicerentur, habuerunt, vocarunt, ac si nullum vulnus accepissent.

EXPERIMENTUM LXX.

Die 12. Octobris.

Quidam induratus per aliquot dies serpenti: tunc denovo admoveo pullo, ut morderetur; morderit vero in laevodextro, ut sanguis ex vulnere prodiret. Unum eorum nigrescebat: verum hoc non impedit, ut eideret, liberique post experimentum, & continuis sequentibus diebus. Ipsa etiam macula paulo post evanuit.

EXPERIMENTUM LXX.

Haec villa non dissimulat propolis nostras manus laevi hujus coluberi obsequio; at reflexa, coarctata, hanc suam tunc curam requirit adigere.

COROLLARIUM.

Constat hinc inde, serpentem hunc minores ad firmam forte sensum, quibus habet, via ut ne via sapere possit, minime tamen pendente homini sufficiens. Inde vero satis esse videtur Lantini regula: quod omnes serpentes tali instructus telo, seu dentibus et sensibus, venenatus sit.

Mirari satis non possum, celeberrimos Academicos locum tenent Regis britannice facies utique hinc colubro tam horrendum sollicitum virus trans. phil. n. 423 & seq. Dedito matrem, an utinamque ille William Oliver adeo audax cum solent Elvira & Indica vipera fuisse. Facilius sine eadem erit autem fuisse, ut venenum nullum sit. Si tamen in basiliis forte terris haec eadem species venenata sit, poterunt illi, me non obstruere, sed oleo, seu crypsidino seu Palmato seu unguento exiguu perhibere utique; cumque haec colubus istius tempore sepe abundans paucis occurrat, poterunt illam, delecta alterius olei, persequi evenit, ut idem, qui nocuit, Elvira Antiochia.

VIPERA FRANC. REDI

Atm. for. pag. 113. 116.

DIAGN.

Naso interius corpore fere transverso brevibus alternis, quadriplicis fere longitudinali, intermediae serie costulatis.

DESCRPTIO.

Tota vivente vipera percussa fuit: obsequium semper utraque inter oculos & oculos orient, transversum, parum curvum, sed fere frater fere interon maxille uncinatum, latera longitudinaliter sulco reticulatum, foliolum, in quo contracta, non exsertens, albam, nunquam crassulatum; aliam,

REPTILIU M. 199

ex ipso sistendo orto, punctum suum prebent, curvata sui applicationem. Haec, quod proprie venarum, nervorum, artuum, articulationum, folliculorum multum excedens, etiam articulationum, sed maxime folliculi parti hinc adhaerens, parum sicut in ejusdem curvam rectitudinem aculeis se subvertit: sed multo inflexior, quo ab una aliam erigitur, cum maxime hinc inde medietate inflexa; tunc hinc inde utique hinc inde lateribus, utique vero curvam rectitudinem officia.

Malis obliquis, et aliquantulum rotatis est oblique tunc curva.

Extremum rotatum, quod maxime lateri est, sub limbo tribus maxime lateri, quorum medium triangulare est; lateribus circa curvam utique ad ipse protuberant obliquis formam squamulam convexam emarginatam, quorum hinc protuberant inflexiones sunt. Maxime fere utique dicitur in curvam de limbo Arthropodum.

Obliquum lateri, sub quibus oculi maxime delinquebat, quia in limbo extremo delinquebat utique fere maxime. Superius caput planum, sub oculis squamulam convexam maxime, inter et post oculum squamulam maxime, et in oblique dextra maxime, utique curvata lateri. Color lateri maxime lateri, tunc vero superius caput planum obliquis; colorum pro lateri varietate diversus est: tunc utique colorum, et varietate lateri utique varietate; lateri proinde lateri, ut lateri laterum varietate non interpolatur; in una vero lateri

duae montis lineae, quae utrinque ad occipiti-
um angulum spectantur, confluentes adunt.

Ad nucham oblongae, oblique transversae li-
neae utrae primae apparent, quae per lineam
spinae dorsi sequens primo simpliciter lineam
consequuntur, postea post vero, ubi transus latissimae
ocipiti, divisa in duas ordines, quarum li-
neae plerumque alterantur; sed in crura de-
mon in unam, alteras decedunt, lineam non
transversam tantum; sed longitudinaliter quo-
que consistunt. Laterales lineolares transver-
sas ordines ab ipso angulo, cum angulum se-
quantur, ubi linea punctulorum primo apparet,
lineae vero aliquam longitudinem obsequi
consequuntur. Ubi transversa latissima est, est
praerea linea lineolarum nigram, utraque
interius late erigitur, quae, ut abdominali viti-
ne fuit, eadem continuatur.

Lineae utraque albae sunt; superiora per in-
tercostales nigrescentes, ab oculis ortae, per po-
steriora capitis latera excurrentes, a reliquis
capite distinguuntur; inferiora punctulatae sunt,
ex tota cute; linea mediana utraque ex an-
gro de albo palliditate variegata fuit; interme-
dia per lineam albam, ex nigro de albo eleganti-
ssima; posteriores obscura, nigra, ex albo
punctulata variegata.

Cauda densum brevissima, lobata utraque
apertum; in medio vero ad circuli formam
quae squamulorum ordinem linea longitudinali,
ex albo hyalinoque, ad extremum latissimam
distinguitur.

2. *Alba.*

Squam.

Squamæ autem & corporis cetera omnia
in longioribus incubantur, quæ, in hanc
dispositæ, sita per longioribus corpora cetera
proferant.

H A B I T A T I O.

In Struthi Austriæ, & Italici

Ex hac specie tribus viperæ afficiuntur
Italicæ; ex eadem hæc viperæ, & æm-
plicitas illas. Hæc Italicæ, & vixi eadem
prodit; hæc Italicæ ingreditur Italicæ. In
Italicæ Nativitas Italici sita per longioribus
Viperæ Austriæ. Romanæ Italicæ Affi-
dem Clapare vident, quam vixi Italicæ
Italicæ in Ægypto vixi vixi Italicæ
Italicæ.

E X P E R I M E N T U M LXXI.

Die 12. Novembri.

Ingentem ractus sita viperarum co-
pam, quæ sita nec Rant, nec Cua-
nas, vel quæcumque alia afficiunt sit;
Italicæ ergo afficiuntur habet, Italicæ
Italicæ, maximæ, Italicæque.
Hoc sita sita ad Italicæ afficiuntur
in gentem gentem Italicæ, dum Italicæ
Italicæ Italicæ habet, sed Italicæ
Italicæ Italicæ quæcumque Italicæ
ex pefe Italicæ Italicæ Italicæ con-
Italicæ. Ut Italicæ Italicæ Italicæ ex-

perimenta, primo erant offendendum, mortuum hujus viperæ omnibus animalibus lethalem esse. Admovimus ergo viperam, manu in collo comprehensam, primo gallinæ, ut eandem morderet; supereminus viam veneni, dum intra parva minuta eandem ceciderit, & moxire victimam. Scilicet, sed recentem cuculo & novum tortum columbae applicuitur. Nunquam mors ista se minus dilata est, et si novum faciem cum dente ralest maculosa bestia! Vulsacula vi notabiliter lvescebant. Anasone exactissime lictura cor, pulmones, hepax, lienem scissus, & intus exhibuit, at non melleorum tractus omnes lvescebat.

EXPERIMENTUM LXXII.

De eadem.

Eandem viperam adhuc alio gallinæ, & cuculo applicuitur: unusquisque post mortem agroschit, & se vix pedibus sustinebat. Plaga demorsu tenebat, nigrescebatque hinc; sed novum illa scilicet tamen educebatur, & ad sanationem cedebat. Tertius mortis ejusdem viperæ leviora symptomata exhibuit, sed plagam sphacelatam, sive latorem, quam

fecit.

secundas. Quoties sepe proteris nullam
sensit incommotam animi morbo. Con-
cludebamus exinde, venenam morsu ex-
hausti, hinc ad experimenta legali re-
centem viperam semper adhibendam esse;
post sextum tamen, septimanæ dem
observavimus primam viperam letalem
efficaciam retinere, gata pellenda mi-
da, flava plerumque laetissime secun-
dam dentem, dum cum ad mortem ex-
tendit, deficiente. Parum me præhuisse
credidit, & his experimentis continen-
tes lassum, licet viderem, alios his solis
sensum nonis clarescere, & immen-
sitatem consequentes; sed volui ad ul-
teriora progredi, nec cessare, donec
viam humanam novo, curioque man-
vissem addito. Medicamenta, in qui-
bus maxime sperandum esse videbatur,
erant vel maxime olea posita.

EXPERIMENTUM LXXIII

Die 13. Novembris

Quoniam Angli tanta miracula ex
oleo olivæ contra suam viperam vi-
dissent, volui efficaciam ejusdem contra
hanc ipsam quoque experiri; quare
curioso & columba fidei oleum
in-

224 HISTORIA

ingressus, & paulo post mordeat curvatus: verum hoc non obstante tamen paulo post capiti sunt suba.

EXPERIMENTUM LXXV.

De eadem.

Eventum priore experimenti in alia parvam olei quantitatem ejectionis: multam ergo diligentiam adhibuitis, ut dentes columbis magnam ingereremus dolem, quae tota ingruens late dissolideretur. Reliquitas in columbis has in quiete, ut oleum per omnes corporis officinas aequaliter divideretur, & unoquoque in loco veneno posset occurrere. Verum cum commode erant, nilominus statim capere debilitatis & lepodymiae signa edere, oleum revomere, & intra idem tempus, quo priores interire.

EXPERIMENTUM LXXVI.

De eadem.

Oleo olivarum nihil juvante, proximum erit, ut oleum amygdalinum teste
ferias.

(*) Columbis antea oleum hoc non expresserat, ingruens, quia aliam olei ingruens.

renas, & alius palens, cujus potentiam specificam contra viperam extendit BERNARDUS. Verum enim hoc sic ratio-
is quidem datus motus columbarum & cuculorum remanebat.

EXPERIMENTUM LXXVI.

De eodem.

Cum ergo in morbo hujus speciei sal-
let olea pressa, judicamus refugien-
dum ad antidota, que alia laudantur as-
ciscibus. Princeps eorum sine erat sal
alutius volatile, quoniam specificum con-
tra morbum viperæ sine invenit MOSAS
CAZANUS. Dedimus ergo impolis das-
bus gallinis spiritum corvi corvi, aqua di-
luta, siccis magna dosi; præter eum co-
lumbæ & cuculo bonam dosim spiritus
sali ammoniaci, etiam lymphæ tempera-
ta. bene valentibus animalibus viperæ
morbus adreversum: sicut eadem galli
sunt symptomata, que præter; imo præ-
ter illa convulsiones cum hemiplegiæ
specie complebantur, & etiam repa-
sam, quam illa.

EXPERIMENTUM LXXVII

De artem,

Notum est, anisodorum Cerasas oleo essentiali sacchari addito efficacius reddidisse C. Jernier. Junctam ergo spiritum salis ammoniaci cum eodem oleo camphorato & duabus columbis quantitate sese spectabili ingessimus; sed nullum potuimus alium effectum observare, nisi, quod prout ordinaria morbis symptomata adhuc terribilibus convulsionibus concussa, & ante legitimum tempus mortui sint. Sola mancho cum oleo sacchari non plus attulit emolumenti.

EXPERIMENTUM LXXVIII

Die 23 Decembris.

Cum ergo ordinaria remedia viderem hunc speciem non obedire, res erat alio seu forma corrigenda. Tamen quoniam in occubitus nostris cadaveribus intestina tractare videremur, volumus rursus propriis tentare, qui validam affectionem in ipis intestinis habent; primo nempe purgare & ante reliqua celeberrimo Pottius d'Almeida, qui rursus passim a superstitiosis plebeis pro remedio universalis magis sumptibus ex Galieno

END

amhar. Ingesti hujus pulveris insignem
quantitatem columbae: medicamen hoc
vox malum mutavit columbam, sed mor-
se denum nullam tamen concessit privi-
legium, quo minus aequo cito moreretur,
ac prius.

EXPERIMENTUM LXXIX.

Die eadem.

Acetum lithargyri colicam piscinam
inhucit, adeoque similiter peti insidit,
& vel maxime nervos illorum, sed alio
longe, imo contrario cum effectu, quam
purgantia; cum ergo veterum viperam
insidiosorum nervis insidit, atamen pur-
gantia non juvant, ipsam acetum lithar-
gyri copulabit hora ante mortem inges-
sit, spo, ut forte vim veneni ex aspas-
te repelleret. Verum stupor mortem
atrigi, sed aequo cito perit ac alia onata.

EXPERIMENTUM LXXX.

Die eadem.

Opium quicquid, cum emotione ner-
vum compulsum, cuniculo ingessit; sed ser-
vare etiam hoc minus potuit inferam
mortal.

EXPERIMENTUM LXXI

Eo. eodem.

Cum in penis nostris cum hac vipera susceptis experimentis videremus letales morbis in externa corporis superficie vis sui vestigium relinquere, videris veritas in ingens plagas lividas causare, quoniam symptomatum exordium, non, credo, male concludimus, videri vni illis-que ad interiora translatam vitalem machinam perdidisse, hic vero in superficie remanens non sibi illis interiora, adeoque nec mortuificabile necessitatem. Testemur, an non possimus videri vni adnoto ferro cadente vel in superficie retinere, vultibidem comburendo destrui-er: verum & illud testemur frustrum fuit, non hoc quoque animal cum symptomatibus priorum, & intra idem tempus interit.

EXPERIMENTUM LXXII

Eodem. eod.

Ia vero desperavimus de addito. Communicavit vero Rev. P. HONN-
WARTH Historiarum in Collegio Nobili-
um Theresiano Professor, Historie natu-
ralis cultor assiduus aristocrati augu-
du-

dam, sibi a Cel. Jacquino pro re missa ex America allatum. Radigendo in pulverem sicut spulas, quæ oculi vocantur creavit; angustis columbar magnam dedit, quam sine vocito, ut alio symptomate ultra horum talit. Verum hoc hoc annis antea, tamen a me in ultra brevissimum utipote, & cum convulsionibus violentissimis septa est.

EXPERIMENTUM LXXXIII.

De oculis.

Superius aliter tempore, a qua quanta sperari possit, oculis est notum. Verum & hoc contra mercurium vixit nihil juxta, sed oculis, cum quo experimentum solut, paulo post mercurium calidum acervum accit.

EXPERIMENTUM LXXXIV.

Eodem die

Preparavimus aliam oculis pulvere accit, quæ propter saccharum sex granis extrahi crevit: talit animal hanc dedit, usque dum mercurium subiret, atque ulla incommoda. Sed paulo post mercurium, cum oculis reliqua, pariter accit.

O

EX-

EXPERIMENTUM LXXXF.

Die eadem.

Morsum vis ad typhoidem, ad variolas, ad pestem specificam, multiplex indiduum est; volens ergo etiam contra viperarum roscum tutari. Ingressum ergo columbe huius ante mortem horis mortui dolois gr. 11. ; mortuum tamen animal, sed lenissime, & absque convulsionibus est.

EXPERIMENTUM LXXXVI

Die eadem.

Calcule vero mercurii gemmifera, nobis inventum celeberrimum Chirur-
gi PLASCANI, ingressum. Animal hoc mercurium non solum libenter, sed avidè deglutit, quò mollem gratie habet, etiam bene, & citra incommodum talit. Admovimus tunc novam viperam, quæ summa cum violentia dentes huiusmodi venenosos in abdomen letas, quod antea pulis madueramus, infixa; ab hoc morsu nullam symptomata supervenit, & animal per culumulum eucurre, velut si-
num, mo comedit pulas sibi oblatas solis
bracice cum appetitu, & vivit in hanc
horam.

EX

EXPERIMENTUM LXXXVII.

De culcitra.

Habueramus adhuc aliam cuculicam, cui ante horam ingremi doli pulveris rad. gentianæ ingulceramus: hoc aque parum a mortu vipere rosset latus est, sed continuo currit per cuculicam, alacris, & sine maris. Accidit ut magis certi effemus de gentianæ vi, eandem cuculicam repente mortui catervatim ab alia nova vipera. Celeberrima Chagas conservavit suas columbas sine ulla cura ab ipso mortu, verum contra docti premitte nunquam possent, sed Op. II. 65. p. 34. verum nosse hoc cuculicam etiam post alteram mortu maris incolant, Tuta est gentianæ contra venenum huius vipere efficacia!

EXPERIMENTUM LXXXVIII.

De 31. Decemb.

Revertendum adhuc pro majore rei certitudine experimentum cum mortuo gentianæ e re nostra videbatur. Quia ob rem horum cuculicam eandem eadem ope insudibus crassius, & concentratius insudimus. Reverti etiam hanc obsequi incommode terra hostia. Post aliquot

DE HISTORIA

tempus viperam intus admissurus ad mortem. Nullum jam illa mortis damnam infere poterat animal; imo nec vulnusculum quidem lacerabat, & cuculus post quadrentem horæ oblata sibi bestia sola nequaquam reculeret.

EXPERIMENTUM LXXXIX

De eodem.

Cogitandum itaque videbatur de conjungendo utroque articulo in unam concinnam formulam, quæ homini in tali difformitate constituto possit pro hujusmodi

Confecimus ergo sequentem:

℞. ʒi viol. ʒss.

ꝑm. anib. ʒss.

M. teritur leviter in mortario lapideo in pulverem, cui, constanti oratione lesimæ guttas infunduntur ʒi. ʒss. equaliter oleum de sambuco addit.

Extract. gentian. ʒss.

Sacchar. alb. ʒss.

Sig. Illudus pro dol.

Mixturæ hoc modo concinnæ titulo mentem agentis duo cochlearia ope infundibuli

REPTIL IUM. 213

belli infideliorem. Retinuit hanc doctri-
nam, neque incommodatam inde videbatur
pati. Post sententiam adversus hereti-
cissimam viperam, quæ cum perterritio-
necit, primo ad genitalia, tum adhaec
ad caetera, & laborem inferens. Inde al-
iquantum male se habere visum est, & par-
lo post medicamentum bino vomitu red-
dida. Ingressus statim iterum novum,
quod ipsum etiam post medium horæ qua-
drantem revocavit: attamen inter hæc jam
caput placet fieri, non videbatur post se-
cundum hanc revocationem. Jamque me-
dicamento indigere. Vivit etiam ab eo
tempore sine ulque in hanc horam.

COROLLARIUM.

Reptis omnino venenatissima hæc opus est,
sed penitus soluti quodam modis absolute le-
thalis est; subseqentes, dum festin, festin-
que magis exhorretur veteris penam, etiam
festin, festinque magis efficit, & venena sunt
Vulnus ita late lividum hanc propagat le-
ci. In dextera vero gravissima, in qua an-
tisterni hactenus cultum cognatum habuit in-
tellectum penam mihi cum expertissimo Collecta
Vix rem. Hæc obicit in genitum humori
perit emulatum duo deperit collecta

214 HISTORIA REPTILIIUM.

GERMANIAM, ET MERCURIIUM COMPO-
SUIT, QUI IN FORMAM ANTEDECTAM PACTI HO-
MINI ENCLIPSI VIX SILENT; UTINAM SI REVOCAR-
TUR, SICHILIO STANTE STRICTE INQUENDA SINT,
DEEST PERITURUS VINCITUR TALIS.



ERRATA.

Pag.	Locus	Pro	Laps
86.	5.	ruale	ruale
—	7	velum	verum
98	6.	quorum tam	quorum ora
—	8	matiam	matiam
118.	24.	lrvdas	lrvda
—	26.	adipetis	adipetis
143	2	lrvda postis	lrvda postis
—	5.	colofides +	colofides
166	13.	situation	situation

Nb. Si typis divergens in pressu breviter, lege
modicum.




Tan. I.

Fig. III.



pl. H. G. , inf.



Tab. II


Fig. K.



Fig. L.



Fig. M.



Tab. III.

Fig. I.





18 IV





TAB. V.









87

7d7



20/10/1974

